

## Тестовые задания по специальности «Общая врачебная подготовка»

При варке яиц аллергенность белка

- повышается
- снижается
- существенно не изменяется
- Верно все перечисленное

Какие смеси целесообразно использовать при непереносимости белков коровьего молока у детей?

- фитолакт
- детолакт
- биолакт
- верно все перечисленное

Отек Квинке у больного возник при контакте с сухим кормом для рыбок (дафниями). Какой вариант перекрестной пищевой аллергии можно ожидать у данного больного?

- на мясо
- на вареную рыбу
- на сушеную рыбу
- на раков и крабов

Крапивницу принято считать хронической, если она длится

- не менее 2 недель
- не менее 4-5 недель
- не менее 2 месяцев
- не менее полугод

Ведущим в лечении пищевой аллергии у детей является

- лекарственная терапия
- фитотерапия
- диета
- иглорефлексотерапия

Что из перечисленного применяется для диагностики пищевой аллергии у детей?

- пищевой дневник
- элиминационные пробы
- провокационные пробы
- все перечисленное

У больной контактная крапивница возникает при ношении нейлоновых изделий. К каким из перечисленных препаратов можно ожидать перекрестную аллергию у данной больной?

- к антибиотикам
- к витаминам группы В
- к нитрофуранам
- к сульфаниламидам

Укажите ведущий фактор сенсибилизации для детей первых месяцев жизни

- пищевые аллергены
- пыльцевые аллергены
- бытовые аллергены
- лекарственные аллергены

Клиническая картина пищевой аллергии может сопровождаться

- кожным зудом
- бронхоспастической реакцией
- снижением артериального давления
- всем перечисленным

У пациента 44 лет после употребления рыбных консервов появились кожный зуд, крапивница, урчание в животе, диарея. Температура тела - 37.3град.С. В анализе крови: лейкоциты -  $8.0 \cdot 10^9$ , эозинофилы - 2%. Уровень общего IgE сыворотки - в пределах нормы. В анамнезе: хронический гастродуоденит, аллергических заболеваний и реакций в прошлом не было (в том числе и реакций на рыбу). Какое диагностическое предположение наиболее вероятно в этой ситуации?

- пищевая токсикоинфекция
- пищевая аллергия
- псевдоаллергия
- обострение хронического гастродуоденита

У ребенка 8 лет регулярно возникают диспептические явления и диарея после употребления сырого коровьего молока. Кипяченое молоко, а также козье (в любом виде) он переносит нормально. Какой диагноз наиболее вероятен?

- псевдоаллергия
- пищевая аллергия к коровьему молоку
- непереносимость лактозы
- хронический гастрит с пониженной секреторной функцией желудка

К числу основных эффектов инсулина, реализующихся в скелетных мышцах, можно отнести все перечисленное, за исключением

- усиления утилизации глюкозы
- усиления синтеза гликогена
- усиления образования жирных кислот
- усиления утилизации аминокислот

Гипогликемия у больного сахарным диабетом может быть вызвана

- приемом сульфаниламочевинных препаратов
- приемом бигуанидов
- приемом алкоголя
- введением неадекватно большой дозы инсулина

При наличии у больного слабости, пигментации кожных покровов и слизистых, гипотонии, тошноты, рвоты в первую очередь следует подумать

- о болезни Аддисона
- о вторичном гипотиреозе
- о гемохроматозе
- о гиперпаратиреозе

Для диагноза подострого тиреоидита характерно наличие всех перечисленных симптомов, за исключением

- повышения температуры тела
- ускорения СОЭ
- снижения захвата  $^{131}\text{I}$  щитовидной железы
- повышения захвата  $^{131}\text{I}$  щитовидной железы

Больной 30 лет, страдающий сахарным диабетом I-го типа, обнаружен в коматозном состоянии через 3 часа после введения инсулина. Какое мероприятие необходимо выполнить в первую очередь?

- снять ЭКГ
- ввести 5% раствор глюкозы
- ввести инсулин (10-20 ЕД)
- ввести 20 мл 40% раствора глюкозы

Относительно секреции альдостерона справедливо

- контролируется, главным образом, гипофизом
- стимулируется низким потреблением натрия
- снижается при стенозе почечной артерии
- повышается при назначении каптоприла

Больная 40 лет жалуется на зябкость, сонливость, запоры. При объективном исследовании обнаружено увеличение щитовидной железы и заподозрен первичный гипотиреоз. Для подтверждения данного диагноза наиболее информативно

- проведение сцинтиграфии щитовидной железы
- определение уровня ТТГ
- определение уровня Са<sup>++</sup> в крови
- определение Т3

При диабетическом кетоацидозе выявляются все перечисленные нарушения, за исключением

- снижения периферической утилизации глюкозы
- повышения протеолиза
- снижения липолиза
- увеличения диуреза

Инсулин стимулирует депонирование углеводов в форме

- глюкозы
- лактозы
- гликогена
- сахарозы

Для гипопитуитаризма характерны все перечисленные признаки, за исключением

- надпочечниковой недостаточности
- гиперпигментации
- избыточного оволосения
- гипотиреоза

Сцинтиграфия служит основным способом выявления

- подострого тиреоидита
- зоба Хашимото
- диффузного токсического зоба
- токсической аденомы щитовидной железы

У больной 17 лет отмечается полиурия с низким удельным весом мочи. После проведения теста с ограничением жидкости величина удельного веса мочи не изменилась. Наиболее вероятно, что у больной

- психогенная полидипсия
- несахарный диабет
- сахарный диабет
- хронический пиелонефрит

Дифференциальная диагностика при трахоме проводится

- с конъюнктивитом с включениями (паратрахомой)
- с весенним катаром
- с аденовирусным фолликулярным конъюнктивитом
- все перечисленное верно

Больной 18 лет обратился с жалобами на боли в области век, сужение глазной щели справа. При осмотре: правый глаз - глазная щель сужена в наружной трети, край нижнего века гиперемирован и утолщен, осторожное прикосновение концом стеклянной палочки к центральной зоне воспалительной инфильтрации резко болезненно. Наиболее вероятно, что у больного

- язвенный блефарит
- ячмень внутренний
- ячмень наружный
- халязион

Перикорнеальная (цилиарная) инъекция встречается при всех перечисленных состояниях, кроме

- острого конъюнктивита
- иридоциклита
- кератита
- циклита

На фоне простудного заболевания у больного покраснел глаз, появились светобоязнь и слезотечение, понизилась острота зрения. При осмотре: перикорнеальная инъекция, в центре роговицы - помутнение поверхностных слоев, напоминающее ветку дерева, чувствительность роговицы резко снижена. Наиболее вероятно, что у больного

- острый конъюнктивит
- кератит
- иридоциклит
- острый приступ глаукомы

Больному на работе в глаз попало инородное тело. Заводской фельдшер обнаружил кусочек металла на поверхности роговицы и удалил его. После такой микротравмы могут возникнуть

- гнойная язва роговицы
- посттравматический кератит
- все перечисленное
- ничего из перечисленного

Молодой мужчина обратился с жалобами на гнойное отделяемое из правого глаза в течение последних 3 дней. Больного беспокоит также никтурия и дизурия. При осмотре: веки отечны, конъюнктивы отечна, гиперемирована, резко инфильтрирована. Наиболее вероятно, что у больного

- весенний катар
- гонококковый конъюнктивит
- вирусный конъюнктивит
- язва роговицы

При лечении гнойной язвы роговицы применяется все перечисленное, за исключением

- местных тепловых процедур
- стероидных капель
- капель антибиотиков
- капель мидриатиков

При осмотре абитуриента, поступающего в медицинский институт, выявлено слезостояние справа. При расспросе установлено, что веки по утрам часто склеиваются, периодически выделяется гной в конъюнктивальный мешок. Выявлена припухлость над областью слезного мешка справа, при надавливании на эту область из слезных точек появляется гной. Оптические среды прозрачны, глазное дно в норме, острота зрения 1.0. Наиболее вероятно, что у больного

- острый дакриоцистит
- хронический гнойный дакриоцистит
- хронический конъюнктивит
- дакриоаденит

Инженер-конструктор 49 лет жалуется на покраснение век, быструю утомляемость при работе на близком расстоянии (чтение). При осмотре выявлено: небольшая гиперемия краев век, сероватые чешуйки у основания ресниц, оптические среды прозрачны, глазное дно в норме. Острота зрения обоих глаз 0.5 с коррекцией сферы +2.0D 1.0. Наиболее вероятно, что у больного

- чешуйчатый блефарит
- чешуйчатый блефарит, гиперметропия
- чешуйчатый блефарит, гиперметропия, пресбиопия
- язвенный блефарит, пресбиопия

Клиническая рефракция левого глаза 10-летнего пациента - гиперметропия. Фокусное расстояние линзы, используемой для дали, - 25 см. Преломляющая сила этого оптического стекла составляет

- сфера +5.0D
- сфера +4.0D
- сфера +3.0D
- сфера +2.0D

Среди жалоб при паралитическом косоглазии преобладает

- ухудшение зрения косящего глаза вдаль
- боли при движении глазных яблок
- двоение (диплопия)
- сужение поля зрения

При остром дакриоадените лечебные мероприятия включают

- сухое тепло, УВЧ, синий свет лампы Минина
- активную антибактериальную терапию
- назначение глюкокортикоидов внутрь и местно

При непроходимости слезно-носового канала для устранения слезотечения выполняют

- расширение нижней слезной точки
- активизацию верхнего слезного канальца
- дакриоцисториностомию
- экстирпацию (удаление) слезного мешка

Пациенту 43 года, острота зрения каждого глаза - 1.0. В этой ситуации можно исключить

- эмметропию
- миопию
- гиперметропию
-

Токарь во время работы на станке с металлом получил ранение глазного яблока. При осмотре - острота зрения поврежденного глаза 0.01, не корригируется, на роговице - линейное помутнение (рана с адаптированными краями) длиной 2 мм, в радужке виден небольшой дефект ткани, в проходящем свете - розовое свечение только по периферии. Наиболее вероятно, что у больного

- эрозия роговицы
- контузия глазного яблока
- проникающее ранение роговицы
- непроникающее ранение роговицы

Пациент предъявляет жалобы на возникшее 3 дня назад покраснение и припухлость в наружной половине верхнего века правого глаза, боли в той же области, повышение температуры тела. При осмотре: выявлена S-образная форма глазной щели, отек конъюнктивы глазного яблока в наружной половине, подвижность глаза слегка ограничена кверху и наружу, предушные лимфоузлы справа увеличены и болезненны. Наиболее вероятно, что у больного

- ячмень верхнего века
- острый конъюнктивит
- острый дакриoadенит
- острый дакриоцистит

Наиболее типичным признаком мейбомиевого блефарита является

- гиперемия и инфильтрация век
- чешуйки у корня ресниц
- язвочки и корочки у корня ресниц
- пенистое отделяемое по углам и у края век

Очки для близи пациенту с эметропической рефракцией на обоих глазах в 46 лет

- не требуются
- требуются, сфера +1.0D
- требуются, сфера +1.5D
- требуются, сфера +2.0D

Наиболее частой причиной фликтенулезного кератоконъюнктивита является

- бактериальная инфекция
- вирусная инфекция
- аллергия к туберкулопротеинам
- аллергия к экзогенным аллергенам

Для септицемии не характерно

- высокая лихорадка
- нормотермия
- увеличение селезенки и печени
- скарлатиноподобные высыпания на коже

У женщины 34 лет при пальпации левой молочной железы отмечаются кровянистые выделения из соска. Пальпаторно образования в молочной железе не определяются. Регионарные лимфоузлы не пальпируются. Наиболее вероятно, что у больной

- рак Педжета
- фиброзно-кистозная мастопатия
- саркома молочной железы
- внутрипротоковая папиллома

Для лечения острого панкреатита могут применяться все перечисленные препараты, за исключением

- контрикала
- атропина
- 5-фторурацила
- морфина

У больной 64 лет, перенесшей 5 месяцев назад трансмуральный инфаркт миокарда с мерцательной аритмией, внезапно (за 10 часов до обращения) появились боли в правой верхней конечности, чувство онемения, похолодания предплечья и кисти. Затем боли несколько уменьшились, но при нагрузке вновь появились. Пульсация на локтевой и лучевой артерии не определяется. Чувствительность не нарушена. Кожные покровы несколько бледнее и холоднее, чем на здоровой стороне. Наиболее вероятно, что у больной

- 1 тромбоз плечевой артерии
- тромбоз лучевой артерии
- тромбоз локтевой артерии
- обострение шейного остеохондроза

Сроки восстановления трудоспособности при трещинах кости по сравнению со сроками восстановления трудоспособности при несложных переломах кости той же локализации

- одинаковые
- более короткие
- более длительные
- зависит от локализации поражения

Указаниями на наличие операбельного рака молочной железы (IV стадии) является

- массивный геморрагический плеврит
- деструкция в теле позвонка
- увеличенные подмышечные лимфоузлы
- все варианты

Оперативное лечение больных карбункулом с выраженной интоксикацией и тяжелой сопутствующей патологией целесообразно проводить

- в стационаре
- в поликлинике
- на дому
- верно все из перечисленного

У больной пожилого возраста, 3 недели назад перенесшей острый инфаркт миокарда, возникло ущемление пупочной грыжи. Оптимальной тактикой в отношении данной больной является

- осторожное вправление грыжи
- наложение бандажа
- амбулаторное лечение
- экстренная госпитализация сантранспортом в хирургический стационар

Больным с варикозным расширением вен нижних конечностей рекомендуется

- эластическое бинтование конечностей
- применение препаратов, укрепляющих сосудистую стенку
- длительная ходьба, лечебная физкультура, плавание
- все варианты

Кровоподтек на коже после ушиба появляется, как правило

- через 2-3 ч
- через 12 ч
- через сутки
- через 36 ч

Общими симптомами синей флегмации нижней конечности и острой эмболии бедренной артерии являются

- боли
- отсутствие пульса
- похолодание конечности
- все варианты

Для подтверждения диагноза трещины анального канала достаточно выполнить

- пальцевое исследование прямой кишки
- ректоскопию
- ирригоскопию
- биопсию

Больному всегда показана госпитализация при локализации фурункула

- в области носогубного треугольника и верхней половины лица
- в области верхних конечностей
- в области нижних конечностей
- в области живота

Наиболее вероятно, что у больной

- кавернозная гемангиома
- капиллярная гемангиома
- ганглий
- гигрома

При подозрении на острый холецистит наиболее информативным исследованием является

- пероральная холецистография
- внутривенная холецистохолангиография
- ультразвуковое исследование желчных путей и желчного пузыря
- изотопное скенирование печени

Для неспецифического острого лимфаденита характерно

- субфебрильная лихорадка
- боли в зоне увеличенного лимфоузла
- кожа над лимфоузлами почти не изменена
- все перечисленное верно

Симптом Курвуазье характерен

- для холедохолитиаза
- для рака печени
- для опухоли головки поджелудочной железы
- для острого холецистита



Больной 70 лет обратился к врачу через 2 суток после ущемления паховой грыжи в связи с лихорадкой до 39град.С. При осмотре: в области грыжевого выпячивания - резкий отек и гиперемия тканей, флюктуация . Наиболее вероятно, что у больного

- флегмона грыжевого мешка
- паховая аденофлегмона
- гнойный орхоэпидидимит
- фурункул паховой области

Больная 30 лет обратилась с жалобами на боли в области околоногтевого валика правой стопы, которые беспокоят ее около 3 недель. При осмотре: отмечается припухлость, легкая гиперемия, болезненность в области внутреннего бокового околоногтевого валика, отделяемого при надавливании нет, в этой зоне ноготь подвернут и вдавлен в мягкие ткани. Наиболее вероятно, что у больной

- вросший ноготь
- эризипеллоид
- подкожный панариций
- фурункул

Наибольший риск развития тромбоэмболии легочной артерии встречается

- у больных с заболеваниями вен
- у больных с облитерирующим эндартериитом нижних конечностей
- у больных с сахарным диабетом
- у больных с митральной недостаточностью

При осмотре больной 65 лет отмечается уплотнение, гиперемия, болезненный тяж по ходу большой подкожной вены в нижней трети бедра. Отека нет, температура тела - 37.6град.С. Наиболее вероятно, что у больной

- тромбоз глубокой вены
- острый тромбофлебит большой подкожной вены
- дерматит
- рожистое воспаление

Мужчина 30 лет обратился с жалобами на припухлость и болезненность в области правой лопатки. При осмотре определяется округлое, в диаметре 2 см, опухолевидное образование, связанное с кожей, имеется пора, пальпация в этой зоне болезненна. Наиболее вероятно, что у больного

- нагноившаяся атерома
- лимфоаденит
- липома
- фурункул

У больной 25 лет в правой молочной железе в верхнем наружном квадранте определяются 2 участка уплотнения размерами около 1.5 см, которые уплотняются и становятся болезненными в предменструальном периоде. При осмотре - симптом Кенига отрицательный, симптомов патологического изменений кожи нет, лимфоузлы не увеличены. Наиболее вероятно, что у больной

- фиброаденома молочной железы
- рак молочной железы
- узловатая форма мастопатии
- внутримолочковая папиллома

Больной 40 лет, столяр по профессии, обратился с жалобами на округлое опухолевидное образование на ладонной поверхности кожи. При осмотре: имеется округлое, эластической консистенции образование диаметром 3 см, безболезненное при пальпации, воспалительных изменений со стороны кожи нет. Наиболее вероятно, что у больного

- эпителиальная киста
- атерома
- ганглий
- фиброма

Для лиц пожилого возраста более характерен

- катаральный острый аппендицит
- флегмонозный острый аппендицит
- гангренозный острый аппендицит
- эмпиема

У больного 28 лет, длительное время страдающего запорами, в течение последнего месяца стали появляться сильные боли после дефекации, изредка отмечалась светлая кровь в кале. При осмотре в области ануса патологии не выявлено. При ректоскопии, которую удалось провести только после новокаиновой блокады, выявлена поверхностная рана 1.0x0.4x0.2 см, покрытая пленкой фибрина. Наиболее вероятно, что у больного

- острый геморрой
- рак прямой кишки
- выпадение прямой кишки
- острая анальная трещина

У больной 30 лет диагностирована диффузная фиброзно-кистозная мастопатия. Данной больной показано

- прием йодида калия
- УВЧ-терапия
- прием эстрогенов
- прием цитостатиков

У больного с фурункулом предплечья через 2 дня от начала заболевания появились болезненные полосы гиперемии кожи, направляющиеся к локтевому сгибу. Отмечалось повышение температуры. Наиболее вероятно, что у больного

- лимфангоит
- тромбофлебит
- тромбоз глубоких вен предплечья
- тромбоз локтевой артерии

Для хронического парапроктита с полным параректальным свищем характерно

- выделение газов через свищ
- периодическое обострение болей в прямой кишке
- периодическое повышение температуры
- все перечисленное

При подозрении на тромбоз мезентериальных сосудов необходимо

- экстренная госпитализация в хирургическое отделение
- направление к хирургу поликлиники
- направление в терапевтическое отделение стационара
- лечение на дому

Больная 25 лет обратилась с жалобами на наличие опухолевидного образования в надлопаточной области, вызывающего косметический дефект. При осмотре в этой зоне определяется округлое, тестоватой консистенции образование, подвижное, не связанное с кожей, размерами 10х12 см, дольчатого строения, безболезненное при пальпации, кожа над ним не изменена. Наиболее вероятно, что у больной

- липома
- атерома
- ганглий
- фиброма

Гематогенный остеомиелит наиболее часто встречается

- у мальчиков-подростков
- у беременных женщин
- у стариков
- у лиц зрелого возраста

При выявлении острого холецистита показано

- амбулаторное лечение
- лечение в дневном стационаре поликлиники
- госпитализация в терапевтический стационар
- экстренная госпитализация в хирургический стационар

На обзорной рентгенограмме брюшной полости характерным признаком перфорации язвы желудка или 12-ти перстной кишки является

- наличие множественных чаш Клойбера
- наличие пневмоперитонеума
- раздутые петли толстой кишки
- сглаженность m.psoas

У больной 62 лет левая молочная железа инфильтрирована, отечна, увеличена в объеме и уплотнена, кожа с участками гиперемии, имеющей неровные, языкообразные края, сосок втянут и деформирован, увеличены подмышечные лимфоузлы. Наиболее вероятно, что у больной

- рожеподобный рак
- острый мастит
- рожистое воспаление
- дисгормональная мастопатия

Больная 30 лет 1.5 месяца назад отметила появление мокнутия соска и ареолы левой молочной железы. Затем отдельные участки ареолы стали изъязвляться и покрываться корочкой. При осмотре установлено, что эти участки напоминают экзему, кроме того - увеличены подмышечные лимфоузлы. Наиболее вероятно, что у больной

- маститоподобный рак
- нейродермит
- мастит
- рак Педжета

Тучная больная 50 лет обратилась к врачу с жалобами на боли в левой паховой области. При осмотре: в левой паховой области ниже пупартовой связки и кнутри от а. femoralis имеется небольшое (с грецкий орех) округлое, резко болезненное образование с легкой гиперемией кожи над ним, живот при пальпации безболезненный. Больной был поставлен диагноз "левосторонний паховый лимфаденит" и проводилась противовоспалительная терапия, антибиотикотерапия и местные новокаиновые блокады. Через двое суток состояние больной резко ухудшилось, появились боли в животе, и больная была направлена в хирургический стационар. Наиболее вероятно, что у больной не было вовремя распознано

- тромбоз варикозного узла
- аневризма бедренной артерии
- ущемление бедренной грыжи
- абсцедирующий лимфаденит

У больной 50 лет, выписавшейся из стационара, где ей выполнена надвлагалищная ампутация матки по поводу фибромиомы, страдающей варикозным расширением вен нижних конечностей, внезапно появились боли в грудной клетке, одышка, кровохарканье, цианоз лица. Объективно: пониженное артериальное давление, ослабленное дыхание, влажные хрипы. На ЭКГ - перегрузка правых отделов сердца. Наиболее вероятно, что у больной

- тромбоэмболия ветвей легочной артерии
- острый инфаркт миокарда
- пневмоторакс
- пневмония

Для острой кишечной непроходимости характерны следующие рентгенологические признаки, за исключением

- чаш Клойбера
- свободного газа под куполом диафрагмы
- задержек пассажа бария
- раздутых петель кишки

У кормящей грудью матери появились боли, напряженность и уплотнение в молочной железе (без признаков размягчения) при отсутствии выраженной лихорадки. Наиболее вероятно, что у больной

- лактостаз
- гнойный мастит
- рак молочной железы
- дисгормональная мастопатия

Для установления диагноза хронического геморроя наиболее информативным исследованием является

- пальцевое ректальное исследование
- ректоскопия
- ирригоскопия
- ультразвуковое исследование

Вправление ущемленной грыжи опасно производить

- из-за возможности рецидива ущемления
- из-за возможности развития спаечной непроходимости
- из-за возможности развития перитонита
- из-за возможности развития флегмоны брюшной стенки

Больной с вывихом плеча указывает на чувство онемения в пальцах кисти. Объективно: активное отведение I-го пальца резко ограничено, пульс лучевой артерии ослаблен по сравнению со здоровой. Вывих необходимо вправить

- немедленно
- после консультации с невропатологом
- после консультации с хирургом
- в плановом порядке

При острой кишечной непроходимости наблюдаются

- схваткообразные боли
- задержка стула
- задержка газов
- все перечисленное

При операциях по поводу вросшего ногтя обычно применяется

- проводниковая анестезия по Оберсту - Лукашевичу
- местная инфильтрационная анестезия
- внутривенная регионарная анестезия
- общий наркоз

Направлению в стационар для хирургического лечения подлежат больные

- с подкожным парапроктитом
- с подслизистым парапроктитом
- с пельвиоректальным парапроктитом
- верно все перечисленное

Больной 60 лет обратился через 6 часов с момента появления резких болей в обоих нижних конечностях. Страдает митральным пороком сердца, мерцательной аритмией, гипертонической болезнью. Объективно: состояние средней тяжести, обе нижних конечности бледные, холодные, с мраморным рисунком, активные движения в суставах нижних конечностей отсутствуют, пассивные сохранены, пульсация на бедренных артериях и дистальнее отсутствует. Наиболее вероятно, что у больного

- тромбоэмболия в области бифуркации аорты
- тромбоэмболия подвздошных артерий
- разрыв аневризмы
- острый тромбоз вен таза

У больного, перенесшего месяц назад обструктивный панкреатит, при осмотре определяется объемное образование с флюктуацией в центре в эпигастральной области, живот мягкий, без перитонеальных явлений, температура тела и формула крови в пределах нормы. Наиболее вероятно, что у больного

- опухоль поджелудочной железы
- абсцесс сальниковой сумки
- ложная киста поджелудочной железы
- истинная киста поджелудочной железы

Основным местом обитания лямблий является

- желчный пузырь
- тонкая кишка
- толстая кишка
- внутрипеченочные желчные протоки

Индикатором холестатического синдрома при патологии печени является

- АлАТ (аланинаминотрансфераза)
- лактатдегидрогеназа
- g-глобулин сыворотки крови
- щелочная фосфатаза

Триадой симптомов, позволяющих заподозрить опухоль почки, является

- лихорадка, кахексия, эритроцитоз
- кахексия, анемия, постоянная макрогематурия
- боль, пальпируемое образование, транзиторная макрогематурия
- боль, анемия, дизурия

Препаратом выбора для лечения трихомонадной инфекции является

- олететрин
- метронидазол
- норфлоксацин
- клафоран

Причиной сморщенных асимметричных почек может быть

- хронический гломерулонефрит
- хронический пиелонефрит
- острый интерстициальный нефрит
- острая закупорка мочевыводящих путей

Типичным исходом хронического простатита является

- хроническая почечная недостаточность
- аденома предстательной железы
- рак предстательной железы
- склероз предстательной железы

Уретрорагия – это

- синоним терминальной гематурии
- кровотечение из уретры вне акта мочеиспускания
- гнойное выделение из уретры
- кровотечение из простатического отдела уретры

Для болезни Жильбера не характерно

- наличие ретикулоцитоза
- гипербилирубинемия
- альбумины в норме
- щелочная фосфатаза в норме

Для всех перечисленных патологических состояний характерно поражение почек.

Клубочковый аппарат повреждается в наименьшей степени

- при амилоидозе
- при сахарном диабете
- при синдроме Гудпасчера
- при шоке

Препаратом выбора в лечении хламидийного уретрита является

- доксициклин
- ампициллин
- гентамицин
- нистатин

Характерным симптомом рака мочевого пузыря является

- боли в поясничной области
- терминальная гематурия
- инициальная гематурия
- симптом закладывания струи мочи

Поликистозная почка – это

- синоним мультикистозной почки
- двусторонняя кистозная дисплазия почек
- почка с увеличенным количеством чашечек
- почка, увеличенная в объеме за счет множественных кист

При дифференциальной диагностике хронической и острой почечной недостаточности в пользу ХПН будут свидетельствовать все перечисленные признаки, за исключением

- серо-коричневой пигментации открытых частей кожи
- признаков уремической остео дистрофии
- полинейропатии
- нормальных размеров почек

Основным азотистым компонентом нормальной мочи является

- ион аммония
- креатинин
- мочевины
- мочевиная кислота

Крипторхизм – это

- задержка яичка на пути нормального его следования в мошонку
- отсутствие яичка
- задержка яичка вне нормального пути его следования в мошонку
- блуждающее яичко, переместившееся из мошонки в паховый канал

Наиболее информативным тестом, позволяющим провести дифференциальный диагноз между хроническим персистирующим гепатитом и доброкачественной гипербилирубинемией является

- тест Кумбса
- биопсия печени
- проба с ограничением энергетической ценности пищи
- определение билирубина

Парафимоз – это

- перекрут яичка
- воспаление придатка яичка
- ущемление головки полового члена в суженной крайней плоти
- искривление полового члена

Для подтверждения диагноза амилоидоза почек наиболее информативным методом является

- посев мочи
- проба Реберга
- биопсия почки
- эхография

Основным путем метастазирования папиллярного рака почечной лоханки является

- гематогенный
- с током мочи
- лимфогенный
- прорастание в соседние органы

У пациента на слизистой щеки по линии смыкания зубов выявляются мелкие, с булавочную головку, плоские, многоугольные узелки серовато-белого цвета, формирующие мелкопетлистую сеточку. Перечисленные признаки поражения слизистой соответствуют

- красному плоскому лишая
- псориазу
- вторичному периоду сифилиса
- афтозному стоматиту

Что из перечисленного применяется для лечения бородавок?

- наружное применение кератолитических препаратов
- втирание в кожу противовирусных мазей
- электротермокоагуляция
- все перечисленное

К врачу обратилась женщина 68 лет в связи с быстро увеличивающейся "родинкой" на шее. При осмотре: имеет место узловатое образование с плотно-бугристой поверхностью, по периферии имеются мелкие узелки-отсевы. Укажите наиболее вероятный диагноз

- пигментированный папилломатозный порок развития
- пигментированная базалиома
- сиринома
- меланома

Женщина 40 лет жалуется на интенсивные боли в области поясницы, крестца, правой ягодицы, иррадиирующие в правое бедро. Больной поставлен диагноз "пояснично-крестцовый радикулит". На следующий день больная повторно обратилась к врачу, так как обнаружила у себя какие-то кожные высыпания. При осмотре: имеются ярко-розовые отечные пятна и сгруппированные везикулы, располагающиеся полосовидно от крестца до средней трети бедра. О каком заболевании следует думать в первую очередь?

- аллергический дерматит
- простой пузырьковый лишай
- острая экзема
- опоясывающий лишай

Постгерпетические невралгии чаще встречаются

- у детей ясельного возраста
- у детей дошкольного возраста
- у школьников
- у взрослых

Укажите медикаменты наружного применения, которые могут вызывать дерматиты

- ртуть
- настойка йода
- серная мазь 33%
- все перечисленное



Противосифилитическим действием обладают

- пенициллин
- ампициллин
- сульфаниламиды
- доксициклин

Все нижеперечисленные медикаменты наружного применения часто вызывают аллергические дерматиты, кроме

- мази с антибиотиками
- перекиси водорода
- клеола
- настойки йода

К врачу обратился мужчина 65 лет по поводу бляшки на лице. При осмотре: в левой височной области бляшка округлой формы около 1 см в диаметре с сероватой плотной коркой. При удалении корки обнажилось слегка кровоточащее уплотненное основание. Образование развивалось медленно, в течение многих лет. Укажите наиболее вероятный диагноз

- базалиома
- болезнь Боуэна
- старческая кератома
- себорейная бородавка

Трофические язвы чаще всего локализуются

- на голеньях, стопах
- на бедрах
- на кистях
- на брюшной стенке

При третичном сифилисе обычно поражаются

- кожа
- кости
- сердечно-сосудистая система
- почки

Женщина 48 лет жалуется на болезненность кожи левой пятки, особенно при ходьбе. Больная сравнивает свои ощущения с "гвоздем в сапоге". При осмотре: в центре пяточной области имеется выраженный гиперкератоз округлой формы диаметром около 3 см, в центре имеется западение, определяется своеобразный "стержень", уходящий в глубину кожи. О каком заболевании следует думать в первую очередь?

- остроконечная кондилома
- вульгарная бородавка
- оmozолелость
- подошвенная бородавка

Перечислите предрасполагающие факторы для развития кандидоза

- сахарный диабет
- ингаляции глюкокортикоидных препаратов
- использование иммуно-супрессивных препаратов
- все перечисленное

Алопеция может быть проявлением одного из следующих заболеваний.

- гнездной плешивости
- сифилиса
- псориаза
- а,б

При вторичном сифилисе могут иметь место следующие клинические проявления

- папулы на ладонях и подошвах
- периостит
- плеврит
- гепатит

Подтвердить диагноз первичного сифилиса можно при помощи

- обнаружения возбудителя при микроскопии в темном поле
- положительной реакции иммунофлюоресценции
- биопсии язвы
- обнаружения гиперпротеинемии

Вульгарные угри проходят самопроизвольно после достижения возраста

- 25 лет
- 15 лет
- 35 лет
- 45 лет

Укажите клинический симптом, который может встречаться у больных с витилиго

- гипоэстезия
- эритема
- шелушение
- гипо- или депигментация

Для лечения гидроаденита применяются

- антибиотики
- противотуберкулезные препараты
- глюкокортикоиды
- широкое хирургическое иссечение

У женщины 72 лет на лице, шее, верхних конечностях, обнаружены множественные очаги ограниченного гиперкератоза, плотные бляшки диаметром 1-1.5 см, округлой формы, покрытые плотно сидящими серыми корками. Укажите наиболее вероятный диагноз

- себорейная бородавка
- болезнь Боуэна
- старческая кератома
- диссеминированная красная волчанка

У женщины 60 лет в левой надбровной области врач обнаружил плотную белесоватую бляшку с несколько приподнятыми краями и телеангиэктазиями в ее центральной части. Давность болезни - около 4 лет. Наблюдается медленный рост по периферии. Укажите наиболее вероятный диагноз

- ограниченная склеродермия
- болезнь Боуэна
- склероатрофический лишай
- базалиома

К врачу обратился мужчина 53 лет. При осмотре: в области внутреннего угла глаза слева имеется розоватое пятно овальной формы с плотным, приподнятым, валикообразным краем по периферии, в центре незначительное западение. Болен около 3 лет. Укажите наиболее вероятный диагноз

- кератоакантома
- болезнь Боуэна
- красная волчанка
- базалиома поверхностная

Причиной возникновения поллиноза является

- пыльца цветущих растений (трав, цветов, деревьев)
- вирусы
- грибки
- бактерии

Синонимами поллиноза являются

- сенная лихорадка
- сезонный аллергический ринит
- озена
- а,б

Больной с тяжелой формой лакунарной ангины в случае необходимости должен быть госпитализирован

- в терапевтическое отделение
- в хирургическое отделение
- в оториноларингологическое отделение
- в инфекционное отделение

Женщина 35 лет обратилась с жалобами на головные боли в лобной области справа, усиливающиеся при наклоне головы книзу, ощущение тяжести и болей в области правой гайморовой пазухи, гнойные выделения из правого носового хода, повышение температуры до 38-39град.С, ухудшение общего самочувствия. Жалобы появились два дня назад, до этого в течение недели больную беспокоили явления острого насморка: слизистые выделения из носовых ходов, заложенность носа. Укажите наиболее вероятный диагноз

- острый гнойный правосторонний синусит
- вазомоторный ринит
- хронический полипозный синусит
- острый фронтит

При острых гайморитах инфекция может проникать в верхнечелюстные пазухи

- через естественные соустья
- гематогенным путем
- через кариозно измененные корни 4, 5, 6 и 7 зубов верхней челюсти
- верно все перечисленное

Среди разнообразных возможных микробных возбудителей ангины в большинстве случаев основная этиологическая роль принадлежит

- б-гемолитическому стрептококку группы А
- аденовирусам
- пневмококкам
- стафилокок

Среди злокачественных опухолей ЛОР-органов наиболее часто встречается

- рак гортани
- рак уха
- злокачественная опухоль носа
- рак языка

К симптомам острого ларингита относятся

- сухой кашель
- охриплость голоса, афония
- головные боли
- а,б

К симптомам острого фарингита относятся

- боли в горле
- гиперемия задней стенки глотки
- повышение температуры до 39-40град.С
- а,б

Болевой синдром при остром инфаркте миокарда и остром перикардите имеет общие черты. Какой из перечисленных признаков может помочь при дифференциальной диагностике этих состояний?

- локализация боли за грудиной
- иррадиация в левое плечо
- усиление боли при глубоком вдохе
- отсутствие эффекта нитроглицерина

Что из перечисленного необходимо сделать в первую очередь при подозрении на спонтанный пневмоторакс?

- исследовать газовый состав крови
- провести ультразвуковое исследование грудной клетки
- снять ЭКГ для выявления признаков перегрузки правых отделов сердца
- выполнить рентгенограмму грудной клетки

При отравлении уксусной кислотой промывание желудка следует проводить

- холодной водой
- 2% раствором соды
- теплой водой с адсорбентами
- промывание желудка не обязательно

Для повышения эффективности электрической дефибрилляции при мелковолновой фибрилляции миокарда показано введение

- хлористого кальция
- лидокаина
- атропина
- адреналина

Какой препарат используется при отравлении морфином?

- унитиол
- аденозинтрифосфорная кислота
- налоксон
- витамин В6

Для какого из перечисленных заболеваний приступы почечной колики являются ведущим симптомом?

- опухоль почки
- мочекаменная болезнь
- нефроптоз
- хронический пиелонефрит

Острый ангионевротический отек кожи лица, губ, языка является показанием для назначения

- лазикса
- преднизолон
- гистаглобулина
- гемодеза или реополиглюкина

В каком положении следует производить лечебную иммобилизацию верхней конечности при переломе шейки лопатки?

- в положении полного отведения
- в положении отведения на клиновидной подушке
- в положении приведения конечности к туловищу на повязке Дезо

Все перечисленное является характерным для 2-й стадии астматического статуса, за исключением

- выраженной тахикардии
- повышенного уровня рСО<sub>2</sub>
- появления зон "немого" легкого
- потери сознания

Отметьте расположение межреберных сосудов и нервов на ребре в заднем его отделе

- по верхнему краю
- по нижнему краю
- по внутренней поверхности
- по наружной поверхности

Укажите основной механизм антиангинального действия нитроглицерина

- анальгетический эффект
- снижение интенсивности выброса катехоламинов
- системная вено- и артериодилатация
- отрицательный хронотропный эффект

При подозрении на внутричерепную гематому необходимо

- амбулаторное наблюдение
- обезболивание
- гемостатическая терапия
- экстренная госпитализация в хирургическое отделение

Препаратом выбора для коррекции гипотонии у больного с низким артериальным давлением и преренальной азотемией является

- допамин
- мезатон
- норадреналин
- преднизолон

У рабочего кожевенного производства появились жалобы на ощущение жжения в горле, затруднения при глотании, боли в животе, тошноту, рвоту, диарею, головокружение, общую слабость, затруднения при дыхании. В последующем у больного развился генерализованный судорожный припадок. Объективно выявляется бледность, низкое артериальное давление, чесночный запах изо рта. Каков наиболее вероятный диагноз?

- пищевая токсикоинфекция
- менингоэнцефалит
- отравление ртутью
- отравление мышьяком

У первобеременной 23 лет на 36-й неделе беременности появились жалобы на головную боль, тошноту, двукратную рвоту, неясное зрение. Эти явления появились три часа назад. При осмотре: пульс 90 ударов в минуту, напряженный, артериальное давление - 170/100 мм рт. ст., отеки ног, белок в моче - 3.3 г/л. Укажите наиболее вероятный диагноз

- эклампсия
- преэклампсия
- нефропатия
- рвота беременных

Что из нижеперечисленного нецелесообразно для лечения отека головного мозга?

- осмотические диуретики
- глюкокортикоиды
- диазепам
- антикоагулянты

Показанием к введению бикарбоната натрия при диабетическом кетоацидозе является

- снижение рН крови до 7.3
- гипокалиемия
- дыхание Куссмауля
- резкая дегидратация

Оптимальными методами выявления лиц группы риска по возникновению заболеваний являются

- скрининг
- профилактический осмотр
- учет обращаемости
- верно а,б

Показатель детской (младенческой) смертности определяет

- смертность детей до 14 лет
  - смертность детей до 1 года
- Смертность детей до 3-х лет
- смертность детей 1-го месяца жизни

В суточном рационе углеводы должны составлять от общей калорийности

- 10-15%
- 20-30%
- 40-45%
- 50-55%

Все взрослое население в зависимости от интенсивности труда разделяется

- на 2 группы
- на 3 группы
- на 4 группы
- на 5 групп

Врачу общей практики (семейному врачу) приказом Минздрава РФ N 237 от 26.07.92 г. рекомендована максимальная численность обслуживаемого контингента (с учетом детского населения)

- 2500 человек
- 2000 человек
- 1700 человек
- 1200 человек

Суточные энерготраты компенсируется за счет жиров

- на 10%
- на 20-25%
- на 30-35%
- на 40-50%

В развитии эмбриона принимает участие

- витамин А
- витамин В1
- витамин С
- витамин Е

Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство можно получить с возраста

- 14 лет
- 15 лет
- 16 лет
- 17 лет

При изучении инфекционной заболеваемости основным учетным документом является

- экстренное извещение об острозаразном заболевании
- медицинская карта
- листок нетрудоспособности
- контрольная карта диспансерного наблюдения

Переписи населения проводятся

- ежегодно
- 1 раз в 3 года
- 1 раз в 5 лет
- 1 раз в 10 лет

К функциям ВТЭК относятся

- продление временной нетрудоспособности
- установление группы инвалидности
- определение размеров пенсии
- верно а,г,

Признать пациента недееспособным может

- судебно-психиатрическая экспертиза
- суд
- арбитраж
- прокуратура

Главным правовым актом, регулирующим взаимоотношения субъектов в области охраны здоровья граждан и деятельность здравоохранения в Российской Федерации, является

- Гражданский кодекс РФ
- Кодекс законов о труде
- Закон РФ "О медицинском страховании граждан в РФ"
- "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан"

Заклучение о школьной зрелости дает

- педиатр
- педагог
- логопед
- медико-педагогическая комиссия

Отчетным документом о временной нетрудоспособности рабочих является

- статистический талон
- форма 16-ВН
- персональная карта работающего
- форма 30

Действия лечащего врача, преступно-ненадлежаще оказавшего медицинскую помощь, в случае смерти пациента квалифицируются

- по ст.128 УК неоказание помощи больному
- по ст.221 УК незаконное врачевание
- по ст.106 УК неосторожное убийство
- по ст.172 УК халатность

Ответственность медицинских работников за нарушение прав граждан в области охраны здоровья предусмотрена следующей статьей "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан"

- ст.49
- ст.53
- ст.66
- ст.68

К субъектам обязательного медицинского страхования относятся все перечисленные субъекты, кроме

- гражданина (страхуемого)
- страхователя (работодателя или местной администрации)
- страховой медицинской организации (страховщика)
- врачебной ассоциации

Законом РФ "О медицинском страховании граждан РФ" предусмотрены следующие виды медицинского страхования граждан РФ

- обязательное медицинское страхование
- добровольное медицинское страхование
- смешанное медицинское страхование
- верно а,б



В классификации, принятой в Российской Федерации, выделено

- 4 группы инвалидности
- 5 групп инвалидности
- 3 группы инвалидности
- 2 группы инвалидности

В суточном рационе жиры растительного происхождения должны составлять от общей калорийности

- 10%
- 30%
- 40%
- 75%

При наличии ахалазии (кардиоспазма) пищевода целесообразно использовать

- адrenomиметики
- холинолитики
- психотерапию
- а,в

К факторам риска рака толстой кишки относятся

- неспецифический язвенный колит
- семейный полипоз толстой кишки
- недостаточное употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой
- все вышеперечисленное

Рак поджелудочной железы наиболее часто локализуется

- в головке
- в теле и хвосте
- в хвосте
- вирсунгов проток

Наиболее типичной локализацией патологического процесса при болезни Крона является

- перианальная область
- поперечноободочная кишка
- пищевод
- терминальный отдел подвздошной кишки

При неспецифическом язвенном колите прямая и сигмовидная кишка поражаются

- до 95% случаев
- до 50% случаев
- до 25% случаев
- в 100% случаев

Острый панкреатит наиболее часто сочетается

- с гиперацидным гастритом
- с гиперспленизмом
- с желчно-каменной болезнью
- с метаплазией слизистой желудка

Для диагностики рака пищевода наиболее информативными исследованиями являются

- рентгеноскопия пищевода
- ультразвуковое исследование
- эзофагоскопия
- а,в

Ранним симптомом рака пищевода является

- дисфагия
- постоянная боль за грудиной
- мелена
- осиплость голоса

Санитизирующим эффектом в отношении *Helicobacter Pylori* обладают

- де-нол
- трихопол
- сукральфат (вентер)
- фуразолидон

У пациента, 16 дней назад прооперированного по поводу прободной язвы желудка, появились фебрильная лихорадка, боли в правом боку. При физикальном исследовании легких патологии не выявлено. При рентгенологическом исследовании - правый купол диафрагмы подтянут вверх. В данной ситуации можно предположить

- пневмонию
- эмболию легочной артерии
- поддиафрагмальный абсцесс
- нарушение дренажной функции бронха и ателектаз

Множественные язвы в желудке и 12-ти перстной кишке в сочетании с гиперацидным состоянием и упорными болями в эпигастрии, не купируемые антацидами, наиболее вероятно связаны

- с синдромом Дубина - Джонсона
- с синдромом Золлингера - Эллисона
- с изъязвлением рака желудка
- с язвами угла желудка

Наиболее выраженным антисекреторным эффектом в терапевтических дозах обладает

- метацин
- циметидин
- хлорозил
- гастроцепин
- атропин

Для подтверждения диагноза неспецифического язвенного колита при немается

- ректороманоскопия
- фиброколоноскопия с биопсией слизистой
- ирригоскопия
- все перечисленное

Проявления раннего пострезекционного демпинг-синдрома отмечаются

- через 5-20 минут после еды
- через 60-120 минут после еды
- через 3-5 часов после еды

Через 6-12 часов после приема еды

Мужчина 50 лет, рост 180 см, вес 70 кг. Жалуется на мучительное ощущение жжения за грудиной, усиливающееся при наклонах, в горизонтальном положении, после еды, иррадиирующее в шею, спину, стихающее после приема соды, отрыжку съеденной пищей. Наиболее вероятно, что у больного

- рефлюкс-эзофагит
- стенокардия
- рак выходного отдела желудка

Язва желудка и ДПК

Малигнизация наиболее вероятна

- при язве постбульбарного отдела
- при множественной язве луковицы 12-ти перстной кишки
- при язве верхней трети тела желудка
- при язве желудочного канала

Симптоматическими средствами для лечения поносов у больных хроническим энтеритом являются

- карбонат кальция
- висмут
- имодиум
- все варианты

Препаратом, нормализующим моторику желудка и применяемым для лечения рефлюкс-эзофагита, является

- метацин
- атропин
- циметидин
- церукал

Женщина 46 лет с избыточным весом жалуется на боли в области сердца, эпигастрии, возникающие при выполнении работы, связанной с наклонами, в покое по ночам, периодически возникающую изжогу. При обследовании: ЭКГ в покое и при физической нагрузке - без патологии, Наиболее вероятно, что у больной

- стенокардия
- язвенная болезнь желудка
- остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Больной 56 лет обратился с жалобами на запоры, появление крови в кале, изменение формы кала (лентовидный), боли в низу живота. Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожные покровы и слизистая бледноватые, живот умеренно вздут, в остальном пальпация живота без особенностей. Какое исследование необходимо провести больному в первую очередь?

- ирригоскопию
- копрограмму
- пальцевое исследование прямой кишки
- фиброколоноскопию

Назначать антациды больному язвенной болезнью 12-ти перстной кишки целесообразно

- через 1 час после еды
- за 1 час до еды и на ночь
- во время еды
- индивидуально, накануне предполагаемого появления болей и на ночь