

Субъектами обязательного медицинского страхования являются все перечисленные, кроме:

- * фонда медицинского страхования
- * страховой медицинской организации
- * органа управления здравоохранением
- * медицинского учреждения

Точечные кровоизлияния диаметром до 1 см называют

- * гематомой
- * экхимозом
- * петехией
- * пурпурой

S. Aureus является возбудителем

- * рожи
- * паронихии
- * фолликулита
- * эктимы

Фурункул относят к

- * глубоким стрептодермиям
- * поверхностным стафилодермиям
- * поверхностным стрептодермиям
- * глубоким стафилодермиям

При лечении типичной чесотки у беременных целесообразно назначать

- * серную мазь
- * преднизолон
- * тридерм
- * спрегаль

При локализованной гонококковой инфекции назначают

- * неспецифическую вакцинацию
- * местное лечение
- * 5-нитроимидазолы
- * антибактериальную терапию

Предрасполагающим фактором к развитию микоза ногтей кистей является

- * прием антибиотиков
- * прием гормональных препаратов
- * частый контакт с водой и моющими средствами
- * возраст

Зрелым считают рубец возрастом более (в месяцах)

- * 24

- * 18
- * 36
- * 12

Применение препаратов с бензилбензоатом не рекомендуется детям в возрасте до (в годах)

- * 3
- * 5
- * 10
- * 7

Псевдоатрофический венчик Воронова наблюдается при

- * параспориозе
- * себорейном дерматите
- * псориозе обыкновенном
- * розовом лишае Жибера

Клинической формой экземы является

- * пруриго
- * крапивница
- * дисгидротическая
- * дистальный дисгидроз

Роль кожи в обмене веществ заключается в

- * выделительной функции
- * депонировании биологических жидкостей, продуктов метаболизма, токсинов и т.д.
- * участии в синтезе гемоглобина
- * участии в катаболизме гликогена

При амбулаторном лечении по поводу заболевания, связанного с временной потерей трудоспособности, лечащий врач единолично выдает гражданину листок нетрудоспособности сроком включительно до _____ дней

- * 5
- * 15
- * 10
- * 7

Спонтанное выздоровление при розовом лишае Жибера происходит на _____ неделе заболевания

- * 2-3
- * 1-2
- * 5-7
- * 4-5

Терапия дапсоном требует тщательного лабораторного контроля, особенно функций

- * печени и почек
- * щитовидной железы и надпочечников
- * сердца и легких
- * гипофиза и селезенки

Ранние рецидивы гонореи после окончания лечения возникают чаще всего

- * через 2-6 месяцев
- * через 1-2 дня
- * через 1-2 месяца
- * от 3 дней до 1 месяца

Профессиональная экзема характеризуется

- * связью с психотравмами
- * ремиссией во время отпуска
- * поражением лица
- * поражением кистей и предплечий

Пузырек представляет собой

- * эпидермальное полостное ограниченное образование диаметром 0,1-0,5см
- * бесполостной элемент, возвышающийся над уровнем кожи
- * полостной элемент величиной свыше 1см в диаметре, возвышающийся над уровнем кожи
- * элемент, возвышающийся над уровнем кожи, и имеющий полость с гнойным содержимым

Острое инфекционное воспаление дермы и подкожно-жировой клетчатки называется

- * паронихия
- * целлюлит
- * фолликулит
- * остиофолликулит

Для типичной формы чесотки характерна локализация высыпаний на коже

- * верхней части спины
- * межпальцевых промежутков кистей
- * разгибательных поверхностей нижних конечностей
- * шеи

Появление первых высыпаний на слизистой оболочке полости рта характерно для

- * герпетического дерматита Дюринга
- * синдрома Сенира-Ашера
- * вульгарной пузырчатки

* врожденного буллезного эпидермолиза

Термином «ключевая клетка» обозначается

- * эпителиальная клетка с признаками атипии
- * клетка влагалищного эпителия, покрытая грамм-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой
- * клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грамм-вариабельными коккбациллярными микроорганизмами
- * клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой

При подозрении на токсидермию следует

- * прекратить прием всех лекарственных препаратов
- * снизить дозировку принимаемых лекарственных средств
- * прекратить прием только антибактериальных препаратов
- * заменить принимаемые лекарственные средства препаратами другой группы

Вторичным морфологическим элементом при фурункулезе является

- * эрозия
- * язва
- * вегетация
- * чешуйка

Карбункул относят к

- * глубоким стафилодермиям
- * поверхностным стрептодермиям
- * глубоким стрептодермиям
- * поверхностным стафилодермиям

Под процессом, характерным для доброкачественной семейной пузырчатки Хейли-Хейли, понимают

- * акантолиз
- * спонгиоз
- * аплазию
- * гиперкератоз

При выявлении латентной формы туберкулеза у пациента с псориазом, генно-инженерные биологические препараты

- * назначаются после курса превентивной противотуберкулезной терапии
- * абсолютно противопоказаны
- * назначаются на фоне курса превентивной противотуберкулезной терапии
- * назначаются без курса превентивной противотуберкулезной терапии

К экзогенным факторам, способствующим развитию пиодермии, относят

- * соленую пищу

- * бытовые яды
- * мацерацию кожи
- * отравляющие вещества

Кортикостероидная терапия показана при

- * эритродермии
- * токсикодермии
- * отрубевидном лишае
- * красном плоском лишае

Для лечения чесотки у взрослых показано применение мази бензилбензоата (в процентах)

- * 10
- * 20
- * 30
- * 40

Максимальный срок, на который может выдать листок нетрудоспособности сельский врач, работающий на участке один, составляет (в днях)

- * 10
- * 15
- * 5
- * 20

Развитие токсидермии чаще всего наблюдается при приеме

- * препаратов антагонистов кальция
- * антибактериальных препаратов пенициллинового ряда
- * пероральных контрацептивов
- * комбинированных анальгетиков

Беременным женщинам, с крапивницей рекомендуется назначать

- * фексфенадин
- * лоратадин
- * клемастин
- * хлоропирамин

Длительность скрытого периода при синдроме Стивенса-Джонсона может варьировать от

- * 2-6 месяцев
- * 2-8 недель
- * 24-48 часов
- * 1-2 недель

При внезапных острых заболеваниях без явных признаков угрозы жизни пациента медицинская помощь должна быть в _____ форме

- * неотложной
- * плановой
- * срочной
- * экстренной

К регулярно появляющимся высыпаниям на коже, существующим не более двух часов и исчезающих бесследно, относят

- * пузырьки
- * бугорки
- * волдыри
- * папулы

Поражение слизистых оболочек полости рта при разноцветном лишае

- * характерно для больных сахарным диабетом
- * не характерно
- * характерно для больных со злокачественными новообразованиями
- * характерно для ВИЧ-инфицированных

При витилиго пигментный невус с депигментированным ореолом называют

- * меланома
- * галоневус
- * невоид
- * базалиома

Утолщение зернистого слоя называют

- * спонгиозом
- * гранулезом
- * акантозом
- * паракератозом

Тактика лечения микоза гладкой кожи с поражением пушковых волос включает терапию

- * противовоспалительную
- * наружную антимикотическую
- * системную антимикотическую
- * гормональную

Для наружной терапии глюкокортикостероидами при буллезном пемфигоиде применяют _____ %

- * клобетазола дипропионат 0,05
- * триамцинолона ацетонид 0,5
- * мометазона фураат 0,1
- * бетаметазона валеарат 0,01

Пациенту с _____ рекомендовано наружное лечение такролимусом

- * грибовидным микозом
- * псориазом обыкновенным
- * хронической крапивницей
- * атопическим дерматитом

При разноцветном лишае воздействие солнечного света приводит к

- * появлению везикул
- * появлению гипопигментации
- * бесследному разрешению высыпаний
- * периферическому росту и слиянию высыпаний

Для получения листка нетрудоспособности пациент предъявляет

- * справку с места работы
- * документ, удостоверяющий личность пациента
- * свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
- * документ о семейном положении

Клинический диагноз пациенту, получающему медицинскую помощь в амбулаторных условиях, должен быть установлен в течение _____ дней с момента обращения

- * 5
- * 10
- * 14
- * 7

Дополнительным методом диагностики кандидозной онихии является

- * люминисцентный
- * бактериоскопический
- * культуральный
- * микроскопический

Для красного плоского лишая характерен _____ оттенок окраски папул

- * желтоватый
- * медно-красный
- * сиреневый
- * оранжево-красный

Развитию периорального дерматита способствует использование

- * декоративной косметики
- * глицеринсодержащих кремов
- * фторсодержащих зубных паст
- * спиртсодержащих лосьонов

Течение трихомониаза бывает

- * острым, подострым

- * острым, свежеторпидным
- * только острым
- * хроническим, свежеторпидным

Лечащий врач должен заполнить извещение по форме № 089/У-КВ при выявлении случая заболевания с вновь установленным диагнозом

- * псевдосаркоптоз
- * чесотка
- * педикулез
- * контагиозный моллюск

Клинический диагноз должен быть установлен врачом-дерматовенерологом круглосуточного стационара не позднее _____ часов с момента поступления пациента в профильное отделение

- * 24
- * 72
- * 36
- * 48

Характерным признаком вульгарной пузырчатки при поражении слизистых оболочек является

- * пленка, которая не снимается при поскабливании шпателем
- * выраженный гиперкератоз с папулезными элементами по периферии
- * гиперсаливация и специфический запах изо рта
- * сетчатое серовато-беловатое поражение на фоне эритемы

Шелушение при каплевидном парапсориазе в отличии от розового лишая Жибера

- * в виде «воротничка»
- * муковидное
- * в виде облатки
- * крупнопластинчатое

Дискоидная красная волчанка характеризуется

- * гиперкератотическими очагами на ладонях и подошвах
- * отсутствием роговых конусов Бенъе
- * выраженностью феномена Ауспитца
- * наличием симптомов «бабочки», «каблучка» и Бенъе-Мещерского

Доброкачественное вирусное заболевание кожи, характеризующееся появлением полушаровидных узелков величиной от булавочной головки до горошины с центральным пупковидным углублением, называется

- * нитевидной бородавкой
- * контагиозным моллюском
- * себорейной кератомой

- * папилломой

К экзогенным факторам, способствующим развитию пиодермии, относят

- * загрязнение кожи
- * жареную пищу
- * бытовые яды
- * отравляющие вещества

Врач-дерматовенеролог составляет извещение по форме № 089/У-КВ при выявлении случая заболевания с вновь установленным диагнозом

- * В37.4 кандидоз вульвы и вагины
- * В35.3 микоз стоп
- * В08.1 контагиозный моллюск
- * В36.0 разноцветный лишай

В общем анализе крови при крапивнице может наблюдаться

- * лимфоцитоз
- * эозинофилия
- * лейкопения
- * тромбоцитопения

Врач-дерматовенеролог поликлиники кожно-венерологического диспансера оказывает медицинскую помощь

- * первичную специализированную медико-санитарную
- * паллиативную
- * первичную врачебную медико-санитарную
- * специализированную

К признакам прогрессирующей стадии псориаза относят

- * положительный симптом Картамышева, онихогрифоз, артрит
- * милиарную папулу, изоморфную реакцию Кебнера, ободок периферического роста
- * лентикулярную папулу, розовый цвет высыпаний, ониходистрофию
- * псориагическую эритродермию

Диагноз «Трихомониаз» основывается на данных

- * кольпоскопии
- * субъективных клинических симптомах
- * лабораторных методов исследования
- * уретроскопии

При лечении чесотки бронхиальная астма является противопоказанием к назначению

- * перметрина концентрата для приготовления эмульсии
- * бензилбензоата эмульсии

- * пиперонилбутоксид + эсбиола аэрозоля
- * бензилбензоата мази

Паронихия – это воспаление

- * ногтевого валика
- * сальной железы
- * волосяного фолликула
- * апокриновой железы

Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность, является

- * медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- * листок ежедневного учета врача-стоматолога
- * листок нетрудоспособности
- * страховой медицинский полис

Инкубационный период при хламидиозе составляет (в днях)

- * 15-35
- * 35-45
- * 5-7
- * 10-14

Пузыри у больных пузырчаткой имеют содержимое

- * геморрагическое
- * казеозное
- * серозное
- * гнойное

Первичным элементом при типичной форме красного плоского лишая является

- * пузырек
- * папула
- * бугорок
- * пятно

Сальная железа является частью

- * эпидермиса
- * сально-фолликулярного аппарата
- * апокриновых желез
- * волоса

Вторичным элементом, появляющимся после нарушения целостности дермы, является

- * рубец
- * чешуйка
- * узелок

* вегетация

К атипичным формам чесотки относят чесотку без

- * папул
- * везикул
- * ходов
- * экскориаций

К первой линии терапии при хронической крапивнице относят препараты

- * глюкокортикостероидные системные
- * антигистаминные II поколения
- * из группы адреномиметиков
- * из группы анксиолитиков

Гонорея глаз возникает в результате

- * занесения инфекции в глаза руками
- * распространения инфекции лимфогенным путем
- * распространения инфекции гематогенным путем
- * распространения инфекции каналикулярным путем

Для норвежской чесотки характерно наличие

- * гипо- и гиперпигментации
- * массивных корок
- * мелких язв
- * выраженной лихенизации

При использовании лампы Вуда при разноцветном лишае наблюдают _____ свечение

- * желтое
- * ярко зеленое
- * кораллово-красное
- * синее

При распространенном поражении кожи с наличием множественных влажных эрозий больным пузырчаткой назначают

- * антимикотические препараты
- * нестероидные противовоспалительные средства
- * антибактериальные препараты
- * производные салициловой кислоты

Для типичной формы чесотки у детей младшего возраста характерна локализация высыпаний на коже

- * ладоней и подошв
- * лица и волосистой части головы
- * ушных раковин

- * разгибательных поверхностей верхних и нижних конечностей

К блокатору интерлейкина -17 в лечении псориаза относят

- * гуселькумаб
- * секукинумаб
- * брентгуксимаб
- * устекинумаб

Разработка мероприятий по устранению и предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов является функцией

- * врачебной комиссии
- * консилиума врачей
- * заместителя главного врача по медицинской части
- * заведующего отделением

Лихеноидный параспориоз характеризуется

- * сильным зудом
- * мелкими лихеноидными буровато-красными папулами с отрубевидными чешуйками
- * резистентностью к терапии
- * буровой пигментацией с телеангиэктазиями после исчезновения пятен

Для лечения герпетиформного дерматита применяют

- * дапсон
- * ацитретин
- * цианокобаламин
- * гентамицин

Вульгарный ихтиоз характеризуется

- * телеангиэктазией
- * плотноприкрепленной чешуйкой, гиперкератозом ладоней и подошв
- * нормальной влажностью кожи
- * округлой розовой папулой с пупковидным вдавлением в центре

Атипичной локализацией высыпаний при разноцветном лишае является кожа

- * лица
- * верхней части спины
- * проксимальных отделов верхних конечностей
- * верхней части передней поверхности грудной клетки

Длительность сохранения зуда при пролеченной чесотке составляет до

- * 7 дней
- * 6 месяцев
- * 28 дней
- * 3 месяцев

Экспертизу стойкой нетрудоспособности осуществляет

- * фонд социального страхования
- * территориальный фонд ОМС
- * бюро медико-социальной экспертизы
- * министерство здравоохранения

Акантолиз характеризуется разрушением межклеточных мостиков в _____ слое

- * шиповатом
- * базальном
- * сосочковом
- * блестящем

Для лечения крапивницы больным старше 12 лет назначают лоратадин в дозе _____ мг в сутки

- * 5
- * 20
- * 10
- * 15

Тельца Руффини воспринимают

- * давление
- * тепло
- * холод
- * чувство равновесия

Среди генно-инженерных биологических препаратов для лечения псориаза используют

- * алемтузумаб
- * брентуксимаб
- * ретуксимаб
- * устекинумаб

К глубоким стафилодермиям относят фурункул и

- * гидраденит
- * паронихию
- * вульгарную эктиму
- * псевдофурункулез

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится на уровне

- * лечащего врача
- * эксперта бюро медико-социальной экспертизы
- * главного врача медицинской организации
- * заведующего отделением

Гиперандрогенную алопецию часто сопровождает

- * зуд кожи
- * себорея
- * рубцовое изменение кожи волосистой части головы в виде лент
- * повышенное потоотделение

Вторичный сифилис характеризуется появлением

- * папулезного сифилида
- * гуммы
- * твердого шанкра
- * творожистого налета

УФ-А лучи имеют длину волны (нм)

- * 280-320
- * 320-400
- * 500-650
- * 180-280

Врач-дерматовенеролог проводит осмотр пациента под лампой Вуда для подтверждения

- * альбинизма
- * локализованной склеродермии
- * витилиго
- * лепры

В мазках-отпечатках, поучаемых со дна эрозий после вскрытия свежих пузырей, у больных пузырчаткой обнаруживаются патологические

- * тучные клетки
- * меланоциты и гистиоциты
- * моноклеарные элементы
- * шиповидные клетки

Пациенту с _____ рекомендовано наружное лечение кальципотриолом

- * псориазом обыкновенным
- * витилиго
- * атопическим дерматитом
- * грибковым микозом

Эффектом действия ретинола является

- * сужение пор
- * восстановление липидной мантии
- * снижение секреции себума
- * уменьшение ангиогенеза

В первую очередь при лечении буллезного пемфигоида используют

- * циклоспорин
- * метотрексат
- * преднизолон
- * ацитретин

Высыпания у больных розацеа располагаются на

- * голених
- * груди
- * лице
- * туловище

При амбулаторном лечении листок нетрудоспособности выдается

- * по желанию пациента
- * в день установления нетрудоспособности
- * по окончании лечения
- * с первого дня заболевания или травмы

В отличие от буллезного пемфигоида при герпетиформном дерматите Дюринга наблюдают отложение

- * IgE
- * IgG
- * IgM
- * IgA

Выпадение волос сочетается с дистрофией ногтей при

- * синдроме Гроба
- * синдроме Штейна-Левенталя
- * тяжелой форме тотальной алопеции
- * синдроме Унны

Для обработки эрозий у больных синдромом Стивенса-Джонсона рекомендуют

- * раствор с повидоном-йода
- * анилиновые красители
- * кремы с кортикостероидными препаратами
- * кремы с антибактериальными препаратами

Для лечения чесотки у ребенка в возрасте 4 лет возможно применение мази бензилбензоата (в процентах)

- * 30
- * 15
- * 20
- * 10

Глютеновая энтеропатия ассоциирована с

- * локализованной склеродермией

- * герпетиформным дерматитом Дюринга
- * рубцовым пемфигоидом
- * псориазом обыкновенным

Хроническое рецидивирующее воспаление фолликулов в зоне роста щетинистых волос называется

- * сикоз
- * фолликулит
- * гидраденит
- * карбункул

Гидраденит чаще локализуется в области

- * шеи
- * подмышечной
- * живота
- * спины

Гиперкератоз характеризуется утолщением

- * эпидермиса
- * шиповидного
- * рогового
- * мальпигиева

Наиболее частым осложнением фототерапии является

- * гиперпигментация
- * катаракта
- * лихенификация
- * эритема

Остиофолликулит относят к

- * поверхностным стрептодермиям
- * глубоким стрептодермиям
- * глубоким стафилодермиям
- * поверхностным стафилодермиям

Утолщение шиповатого слоя в результате повышения скорости пролиферации кератиноцитов базального и супербазального слоев эпидермиса с повышением в них энергетического обмена и митотической активности называют

- * папилломатозом
- * акантозом
- * гранулезом
- * спонгиозом

Лечебное питание больных дерматитом Дюринга требует исключения

- * глютена

- * острых блюд
- * углеводовсодержащих продуктов
- * белковых продуктов

Для норвежской чесотки характерно наличие

- * узлов и язв с неправильными очертаниями
- * склонных к группировке и слиянию везикул
- * эритродермии и массивных корок
- * бляшек и жирных чешуек

Фурункулез возникает в результате воспаления

- * апокриновых желез
- * волосяных фолликулов
- * сальных желез
- * эккриновых желез

На медико-социальную экспертизу направляются граждане при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне зависимости от сроков временной нетрудоспособности, но не позднее _____ месяцев от даты ее начала

- * 4
- * 5
- * 3
- * 6

При развитии эффекта «ускользания» на фоне лечения генно-инженерным биологическим препаратом больного с псориазом рекомендуют

- * отменить препарат
- * увеличить дозировку препарата
- * присоединить к терапии метотрексат
- * присоединить к терапии тофацитиниб

Появление высыпаний на лице у 55-летней женщины характерно для

- * мелкобляшечного папапсориаза
- * розацеа
- * обыкновенных угрей
- * почесухи взрослых

Полостной поверхностный элемент, наполненный серозным прозрачным содержимым, размером с маковое зерно до 1 см, называют

- * папулой
- * пузырьком
- * узлом
- * волдырем

Для обработки эрозий у больного буллезным пемфигоидом рекомендуется

- * ультрафиолетовое облучение
- * ихтаммола мазь 10%
- * бриллиантового зеленого раствор 1%
- * салициловой кислоты мазь 2%

Терапию поддерживающей дозой преднизолона у больного буллезным пемфигоидом тяжелой степени тяжести, можно отменить в случае клинической ремиссии в течение (в месяцах)

- * 6-8
- * 2-3
- * 3-6
- * 1-2

Чесотку, выявляющуюся преимущественно при обследовании лиц, бывших в контакте с больным чесоткой, которая возникает при заражении личинками и существует в первоначальном виде не более 2-х недель с единичными фолликулярными папулами и невоспалительными везикулами, называют

- * скабиозной эритродермией
- * чесоткой без ходов
- * псевдосаркоптозом
- * чесоткой чистоплотных

Наблюдается высокая частота ассоциации саркомы Капоши и

- * СПИДа
- * экземы
- * гепатита
- * лимфомы

Первичным элементом при туберкулезе кожи является

- * узел
- * бугорок
- * папула
- * пятно

Группой препаратов, назначаемых по жизненным показаниям больным пузырчаткой, являются

- * антибиотики
- * кардиопротекторы
- * антагонисты кальция
- * глюкокортикостероиды

Блокаторы H1-гистаминовых рецепторов II поколения при крапивнице применяют до исчезновения высыпаний и в течение _____ недель после исчезновения высыпаний

- * 4
- * 2
- * 6
- * 3

В прогрессирующую стадию экссудативного псориаза назначают

- * 2% салициловую мазь
- * витамин В12 и ультрафиолетовое облучение (УФО)
- * системный глюкокортикоид
- * антигипертензивный препарат

Основным путем передачи микоплазменной инфекции является

- * пищевой
- * бытовой
- * воздушно-капельный
- * половой

Скарификационный и аппликационный тесты являются провокационными тестами для _____ крапивницы

- * тепловой
- * вибрационной
- * аквагенной
- * контактной

К терапии первой линии при ранних стадиях грибвидного микоза относят

- * УФА-1 терапию
- * ПУВА-терапию
- * интерферон-α
- * системные ГКС

Вторичным морфологическим элементом при фолликулите является

- * ссадина
- * корка
- * язва
- * трещина

Системная красная волчанка чаще всего встречается у

- * мужчин
- * подростков
- * детей
- * женщин

Гонококки поражают слизистые оболочки, выстланные _____ эпителием

- * кубическим
- * цилиндрическим

- * многослойным плоским ороговевающим
- * переходным

Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не позднее _____ месяцев со дня восстановления трудоспособности

- * 12
- * 6
- * 16
- * 7

При планировании лечения методом общей ПУВА-терапии у взрослого пациента необходимо получить заключение об отсутствии противопоказаний к фототерапии у врача-терапевта, врача-эндокринолога

- * врача-невролога, врача-оториноларинголога
- * врача-уролога, врача-стоматолога, врача-фтизиатра
- * сердечно-сосудистого хирурга, врача -психиатра-нарколога
- * врача-офтальмолога, врача-гинеколога (у женщин)

Резко выраженная реакция Кебнера возникает при сочетании чесотки с

- * красным плоским лишаем
- * педикулезом
- * склеродермией
- * пруриго

Больному токсидермией назначать диуретические средства следует с учетом показателей

- * электролитов в крови
- * мочевины в крови
- * клиренса креатинина
- * артериального давления

К системному антимикотическому средству относят

- * преднизолон
- * бетаметазон
- * лоратадин
- * итраконазол

У ребенка, занимающегося борьбой, появились очаги с четкими границами на лице, шее и верхних конечностях, предварительным диагнозом в данной клинической ситуации является

- * псориаз
- * пиодермия
- * экзема
- * трихофития

Несколько листков нетрудоспособности по каждому месту работы могут выданы при условии работы пациента у нескольких работодателей в течение

- * 6 месяцев
- * 2 лет
- * 1 года
- * 3 лет

Наиболее часто у мужчин микоплазмы колонизируют

- * семенные канатики
- * яички и придатки яичек
- * уретру и мочевого пузыря
- * уретру и крайнюю плоть

При формировании инфекционных гранулем с некротическим распадом в центре первичным элементом является

- * пятно
- * узел
- * папула
- * бугорок

Гонорея глаз возникает в результате

- * занесения инфекции в глаза руками
- * распространения инфекции гематогенным путем
- * распространения инфекции лимфогенным путем
- * распространения инфекции каналикулярным путем

Целлюлит чаще локализуется на коже

- * спины
- * живота
- * нижних конечностей
- * верхних конечностей

В медицинской карте больного микроспорией записываются сведения о

- * предполагаемом источнике заражения
- * контактных лицах
- * животных, с которыми контактировал больной
- * братьях, сестрах, бабушках и дедушках

При проведении цитологического исследования мазков-отпечатков со дна свежих эрозий у больных пузырчаткой выявляются

- * микроабсцессы Мунро
- * клетки Тцанка
- * эозинофилы
- * амилоидные тельца

Врач-дерматовенеролог составляет извещение по форме № 089/У-КВ при выявлении случая заболевания с вновь установленным диагнозом

- * В 08.1 контагиозный моллюск
- * В 38.3 кожный кокцидиоидомикоз
- * В 36.0 разноцветный лишай
- * В 35.4 микоз туловища

При недостаточной эффективности метотрексата в лечении анапластической крупноклеточной лимфомы кожи к терапии присоединяют

- * гемцтабин
- * преднизолон
- * интерферон -α

Процесс утраты связи между кератиноцитами шиповатого слоя вследствие их десмосомно-тонофиламентных контактов называют

- * папилломатозом
- * спонгиозом
- * акантолизом
- * дискератозом

Каков максимальный срок, на который врач-дерматовенеролог может единолично выдать листок нетрудоспособности

- * 10 дней
- * 6 дней
- * 15 дней
- * до выздоровления

Среди генно-инженерных биологических препаратов, поддерживающую дозу 40мг 1 раз в 2 недели, имеет

- * гуселькумаб
- * адалимумаб
- * этанерцепт
- * наталиумаб

К первой линии лечения себорейного кератоза относят

- * топические ретиноиды
- * лазерную деструкцию
- * противовирусные средства
- * химическую деструкцию

IG E- ассоциированными реакциями при токсидермии являются _____
высыпания

- * геморрагические
- * папулезные

- * волдырные
- * буллезные

К признаку, позволяющему отличить обыкновенный псориаз от розового лишая Жибера, относят

- * шелушение на поверхности элементов сыпи
- * расположение высыпаний на лице
- * наличие у пациента зуда
- * постепенное появление новых высыпаний

Оказание экстренной медицинской помощи в дерматологии требуется больным с развившимся синдромом

- * Лайелла
- * Киндлер
- * Блоха-Сульцбергера
- * Сезари

Бледная трепонема проникает в организм плода на _____ месяце беременности

- * 8
- * 6
- * 5
- * 7

Утолщение кожи вследствие различных воспалительных инфильтратов называют

- * рубцом
- * эксфолиацией
- * лихенификацией
- * волдырем

Для системной терапии больному с опоясывающим герпесом рекомендован

- * метотрексат
- * валацикловир
- * дапсон
- * адалимумаб

При локализованной форме склеродермии начальная доза метотрексата взрослым составляет _____ мг 1 раз в неделю

- * 5,0-7,5
- * более 50
- * 30-50
- * 15-25

Для терапии зуда у больных атопическим дерматитом назначают антигистаминный препарат первого поколения, которым является

- * лоратадин
- * клемастин
- * цетиризин
- * терфенадин

Баллонизирующая дистрофия характерна для

- * листовидной пузырчатки
- * атопического дерматита
- * герпесвирусной инфекции
- * вульгарного псориаза

К фактору риска малигнизации солнечного лентиго относят

- * II фототип кожи по Фитцпатрику
- * использование топических средств, содержащих аскорбиновую кислоту
- * гормонозаместительную терапию
- * более трех солнечных ожогов в течение жизни пациента

Больному буллезным пемфигоидом системную терапию преднизолоном рекомендуется начинать в суточной дозе _____ мг/кг массы тела

- * 1,0-1,25
- * 0,5-0,75
- * 1,5
- * 1,75
- * 0,1-0,25

Токсидермию следует относить к _____ заболеванию

- * системному
- * аутоиммунному
- * острому воспалительному
- * хроническому воспалительному

При подострой кожной красной волчанке можно обнаружить ложноположительный тест на

- * ВИЧ
- * гепатит В
- * сифилис
- * гепатит С

При тяжелой крапивнице и /или ангионевротическом отеке рекомендовано введение

- * эпинефрина
- * адреналина
- * преднизолона
- * дифенгидрамина

При сифилисе наиболее часто встречается _____ форма алопеции

- * лентовидная
- * тотальная
- * мелкоочаговая
- * универсальная

Субэпидермальное расположение пузыря при буллезном пемфигиоиде следует дифференцировать с

- * герпетиформным дерматитом Дюринга
- * листовидной пузырчаткой
- * опоясывающим герпесом
- * саркомой Капиши

Среди генно-инженерных биологических препаратов схему введения в 0, 1, 2, 3, 4 недели, затем 300 мг каждые 4 недели, имеет

- * этанерцепт
- * секукинумаб
- * гуселькумаб
- * адалимумаб

Лечение кандидозной онихии с вовлечением матрикса включает _____ терапию

- * гормональную
- * системную антимикотическую
- * антибактериальную
- * наружную антимикотическую

Trichomonas vaginalis сохраняет жизнедеятельность в

- * человеческом организме
- * почве и водоемах
- * организме крупного рогатого скота
- * организме домашних животных

Кандидозная онихия подтверждается обнаружением при микроскопическом исследовании почкующихся клеток и

- * мицелия
- * псевдомицелия
- * лептотрикса
- * спор

Для улучшения течения атопического дерматита пациенту следует рекомендовать в первую очередь

- * контролировать массу тела
- * контролировать уровень глюкозы в крови
- * соблюдать диету

- * нормализовать уровень холестерина в крови

Наименьший риск развития нежелательного эффекта в виде поствоспалительной гиперпигментации имеют пациенты с _____ фототипом кожи по Фитцпатрику

- * VI
- * I
- * IV
- * V

Вегетирующая пузырьчатка характеризуется появлением пузырей чаще в области

- * кожных складок
- * волосистой части головы
- * нижних конечностей
- * поясицы

Новообразованную ткань кожи, возникающую в местах ее глубоких повреждений, при замещении этого дефекта глубокой волокнистой соединительной тканью, называют

- * эксфолиацией
- * чешуйкой
- * рубцом
- * трещиной

Симптом «сетка Уикхема» образуется за счет

- * вакуольной дистрофии
- * неравномерного гранулеза
- * ретенционного гиперкератоза
- * папилломатоза

Чесотку, для которой характерно образование массивных серовато-желтых или буро-черных корок толщиной от нескольких миллиметров до 2-3 см, которая ограничивает движение

- * норвежской
- * псевдосаркоптозом
- * типичной
- * скабиозной эритродермией

К осложнениям псориаза относят

- * алопецию, трихорексиз
- * педикулез
- * артрит, эритродермию
- * гирсутизм, ринорею

Движение трихомонады происходит за счет

- * только ундулирующей мембраны
- * только блефаропласта
- * жгутиков
- * ундулирующей мембраны, блефаропласта

В оптическом спектре ультрафиолетовое излучение занимает диапазон (в микрометрах)

- * 0,38-0,1
- * 0,76-0,4
- * 0,4-0,002
- * 140-0,76

Для лечения трихомониаза с малосимптомным клиническим течением рекомендовано назначение

- * антибактериальных препаратов
- * иммуностимулирующей терапии
- * противопротозойных препаратов
- * местного лечения

После вскрытия пузырька образуется

- * язва
- * эрозия
- * рубец
- * пятно

Больным пузырчаткой тяжелой степени тяжести рекомендуются комбинации системных глюкокортикостероидов с

- * ретиноидами
- * бета-адреноблокаторами
- * цитостатиками
- * морфином

Аутосомно-доминантно наследуется

- * Т-клеточная лимфома кожи
- * вульгарный ихтиоз
- * блестящий лишай
- * склероатрофический лишай

При распространенном поражении кожи при розовом лишае Жибера назначают

- * ПУВА-терапию
- * метотрексат
- * топические ГКС
- * УФА-1 терапию

Формирование рубцов Робинсона-Фурнье характерно для

- * врожденного сифилиса
- * вульгарного псориаза
- * стрептодермии
- * атопического дерматита

Дифференциально-диагностическим критерием эритродермической формы грибовидного микоза от синдрома Сезари является

- * увеличение периферических лимфатических узлов
- * гиперкератоза ладоней и подошв
- * наличие в крови доминантного клона Т-лимфоцитов
- * наличие доминантного клона Т-лимфоцитов в лимфатических узлах

Организацию обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров получают

- * кожно-венерологическим диспансерам
- * центрам госсанэпиднадзора
- * руководителям предприятий
- * территориальным поликлиникам

Глубокий фолликулит, протекающий бурно и остро с вовлечением в процесс окружающих тканей, образованием в центре некроза, называют

- * фурункулом
- * целлюлитом
- * карбункулом
- * абсцессом

Пигментная ксеродерма является предрасполагающим фактором развития

- * базальноклеточного рака кожи
- * меланомы
- * актинического кератоза
- * плоскоклеточного рака кожи

Для выявления IgG- антител к белкам компонентов базальной мембраны при буллезном пемфигоиде, применяют исследование

- * иммунофлюоресцентное
- * иммуногистохимическое
- * иммуноферментное
- * гистологическое

Первичным морфологическим элементом для разноцветного лишая является

- * волдырь
- * пятно
- * чешуйка
- * папула

Анксиолитическим средством (транквилизатором) с Н-антигистаминной активностью является

- * феназепам
- * гидроксизин
- * сульпирид
- * диазепам

Для подтверждения диагноза красного плоского лишая рекомендуются проводить

- * определение уровня общего сывороточного IgE
- * РНГА для выявления в сыворотке крови специфических антител к бледной трепонеме
- * определение симптома Никольского
- * гистологическое исследование биоптата кожи

Одним из ограничений на осуществление медицинскими работниками своей профессиональной деятельности при взаимодействии с различными фармацевтическими компаниями является запрет на

- * участие в научно-практических конференциях
- * оплату отдыха, проезда к месту отдыха за счет организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов
- * участие в работе некоммерческих профессиональных медицинских ассоциаций
- * подготовку публикаций в рецензируемых журналах об эффективности применяемых лекарственных препаратов

«Плод Арлекина» имеет тип наследования

- * сцепленный с X-хромосомой
- * аутосомно-рецессивный с полной пенетрантностью и экспрессивностью
- * сцепленный с Y-хромосомой
- * аутосомно-доминантный

Появление у пациента на нижней губе болезненной, плотной в основании эрозии и увеличенных, плотных, безболезненных лимфатических узлов в подчелюстной области позволяет предположить

- * дискоидную красную волчанку
- * сифилитическую инфекцию
- * многоформную эритему
- * герпетическую инфекцию

Инфицирование человека *S. Trachomatis* происходит преимущественно путем

- * вдыхания инфекционного материала или его адсорбция на слизистой бронхов
- * попадания элементарных телец хламидий на поврежденную кожу

- * внедрение элементарных телец хламидий в клетки эпителия уретры, глотки, слизистой глаза
- * попадание элементарных телец хламидий в кровь

При лечении хронической идиопатической крапивницы, резистентной к терапии блокаторами H1-гистаминовых рецепторов, пациентам 12 лет и старше рекомендуется назначение омализумаба

- * подкожно
- * внутривенно
- * перорально
- * внутримышечно

Фузидовая кислота может быть назначена в форме

- * лосьона
- * крема
- * пасты
- * раствора спиртового

При псориазической эритродермии площадь поражения кожного покрова составляет (в процентах)

- * более 90
- * более 60
- * более 50
- * менее 70

Под ограниченным гнойным воспалением, сопровождающимся некрозом, понимают

- * импетиго стрептококковое
- * абсцесс кожи
- * рожу
- * вульгарный сикоз

Определение антинуклеарных антител проводят при дифференциальной диагностике крапивницы с

- * саркомой Капоши
- * дерматомиозитом
- * мастоцитозом
- * болезнью Дюринга

После исчезновения первичных кожных элементов при крапивнице остается

- * шелушение
- * неизменная кожа
- * некроз кожи
- * гипопигментация

Характерным патологическим процессом для аллергического дерматита является

- * папилломатоз
- * спонгиоз
- * аплазия
- * акантолиз

Болезнь Реклингхаузена характеризуется

- * полинейропатией, пигментным пятном, папулой, фибромой
- * трихоклазией и ожирением
- * атопическим дерматитом и астмой
- * гирсутизмом и катарактой

При отсутствии эффекта от топических глюкокортикостероидов при лечении пациента с дискоидной красной волчанкой для наружной терапии рекомендован

- * адапален
- * такролимус
- * кальципотриол
- * клотримазол

Сочетания эритродермии, гиперкератоза ладоней и подошв и полилимфаденопатии характерно для

- * болезни Девержи
- * грибовидного микоза
- * эритродермической формы псориаза
- * синдрома Сезари

Появление первых высыпаний на слизистой оболочке полости рта характерно для

- * герпетического дерматита Дюринга
- * синдрома Сенира-Ашера
- * врожденного буллезного эпидермолиза
- * вульгарной пузырчатки

К причине гиперкератоза относят

- * ускоренную десквамацию клеток
- * гипофункцию сальных желез
- * низкую скорость десквамации клеток
- * себостаза

При установлении инвалидности со степенью ограничения способности к трудовой деятельности срок временной нетрудоспособности завершается датой

- * закрытия листка нетрудоспособности

- * непосредственно предшествующей дню регистрации документов в бюро медико-социальной экспертизы
- * регистрации документов в бюро медико-социальной экспертизы
- * открытия листка нетрудоспособности

Наличие в морфологической картине микроабсцессов Потрие является диагностическим критерием

- * герпетиформного дерматита
- * грибвидного микоза
- * экземы
- * пустулезного псориаза

У женщины после травмы ноготь I пальца левой стопы лимонного цвета, кожа левой стопы не изменена, у родственников грибковых заболеваний нет, предварительным диагнозом в данном клиническом случае является

- * кандидоз
- * псориаз
- * дистрофия
- * плесневой микоз

Листок нетрудоспособности выдается застрахованным лицам, работающим по трудовым договорам, проходящим

- * периодический медицинский осмотр
- * курс лечения в круглосуточном дерматовенерологическом стационаре по поводу заболевания
- * медицинское обследование или лечение по направлению военного комиссариата
- * медицинское освидетельствование

При назначении лечения ацитретином при болезни Девержи пациентка, способная к деторождению, должна начать принимать противозачаточные средства до начала лечения (в неделях)

- * 1
- * 10
- * 4
- * 2

Работникам предприятий общественного питания, водоснабжения, детских учреждений при наличии у них гельминтоза листок нетрудоспособности выдается на

- * 5 дней
- * весь период дегельминтизации
- * 7 дней
- * 10 дней

Узкополосную фототерапию рекомендуется проводить больному _____, получающему системную терапию _____

- * дискоидной красной волчанкой; гидроксихлорохином
- * атопическим дерматитом; такролимусом
- * псориазом обыкновенным; метотрексатом
- * обыкновенной пузырчаткой; преднизолоном

Врач-дерматовенеролог круглосуточного стационара кожно-венерологического диспансера оказывает медицинскую помощь

- * специализированную
- * первичную врачебную медико-санитарную
- * первичную специализированную медико-санитарную
- * паллиативную

Мелазма чаще всего возникает чаще всего

- * на волосистой части головы вне зависимости от пола
- * у мужчин на коже лица и шеи
- * у женщин на коже лица и шеи
- * на коже тыльной поверхности кистей вне зависимости от пола

В качестве подтверждающих методов лабораторной диагностики хламидиоза у девочек (до наступления менархе) используется

- * культуральный метод
- * полимеразная цепная реакция
- * легазная цепная реакция
- * иммунофлуоресценция

К факторам, повышающим риск канцерогенного действия ПУВА-терапии, относят

- * IV и V фототипы кожи
- * предшествующую терапию метотрексатом
- * общее количество сеансов более 200
- * кумулятивную дозу УФА более 110 Дж/см²

К первой линии терапии при хронической крапивнице относят препарат

- * антигистаминные II поколения
- * глюкокортикостероиды системные
- * из группы адреномиметиков
- * из группы анксиолитиков

Образование неглубоких щелевидных линейных трещин характерно для

- * вульгарного сикоза
- * щелевидного импетиго
- * буллезного импетиго
- * интертригинозной стрептодермии

Наличие в полосовидном инфильтрате в верхних слоях дермы большого количества плеоморфных Т-лимфоцитов малых и средних размеров характерно для

- * парапсориаза
- * токсидермии
- * грибовидного микоза
- * красного плоского лишая

Степень тяжести буллезного пемфигоида определяется по

- * числу появляющихся пузырей
- * наличию поражения слизистых оболочек
- * размеру пузырей
- * содержанию пузырей

Вегетирующая пузырчатка характеризуется появлением пузырей чаще всего на

- * коже верхних конечностей и спины
- * слизистой оболочке половых органов
- * слизистой оболочке полости рта
- * коже волосистой части головы

Альтернативным препаратом системной антимикотической терапии при микроспории является

- * гризеофульвин
- * вориконазол
- * итраконазол
- * кетоконазол

По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности при заболевании может быть выдан до дня восстановления трудоспособности, но на срок не более (в месяцах)

- * 9
- * 6
- * 10
- * 8

Пациентам с невусом Ота рекомендовано

- * проведение криодеструкции образования
- * назначение курса химических пилингов в осенне-зимний период
- * диспансерное наблюдение у врача-дерматовенеролога
- * срочное хирургическое иссечение образования

Листок нетрудоспособности выдается гражданам, у которых нетрудоспособность или отпуск по беременности и родам наступили после увольнения с работы в связи с окончанием трудового договора в течение

- * двух недель
- * месяца
- * трех месяцев
- * двух месяцев

Основой патогенеза пигментной ксеродермы является

- * нарушение порфиринового обмена
- * нарушение репарации ДНК
- * снижение активности тирозиназы
- * повышение активности коллагеназы

При лечении чесотки у детей в возрасте до 1 года рекомендуется применение

- * эмульсия бензилбензоата 10%
- * серной мази 5%
- * аэрозоля для наружного применения перпронилбутоксид + эсбиол
- * перметрина концентрата для приготовления эмульсии для наружного применения

У больных пузырчаткой при исследовании методом реакции иммунофлуоресценции определяются отложения

- * IgG в межклеточных промежутках шиповидного слоя эпидермиса
- * IgA в межклеточных промежутках сосочкового слоя
- * IgM вдоль базальной мембраны и в области дермы
- * IgA на протяжении всего эпидермиса

Диагноз «Токсический эпидермальный некролиз» устанавливают при поражении _____ % кожного покрова

- * менее 10
- * более 30
- * более 50
- * 10-30

Для лечение бляшечного псориаза назначают секукинумаб в дозе (мг)

- * 200
- * 300
- * 250
- * 150

Папиллярные микроабсцессы характерны для

- * вульгарного псориаза
- * склероатрофического лишена
- * грибовидного микоза
- * герпетиформного дерматита

Полиморфная сыпь характерна для

- * нейрофиброматоза
- * вторичного сифилиса
- * крапивницы
- * розеолы

В лечении грибовидного микоза применяют комбинированную терапию, а именно сочетание

- * ПУВА-терапия + метотрексат
- * ПУВА-терапия + интерферон- α
- * метотрексат + ретиноиды
- * ПУВА-терапия + ретиноиды

При пиодермиях наружные антисептические препараты назначают в течение (в днях)

- * 7-14
- * 14-21
- * 3-5
- * 1-5

При гистологическом исследовании биоптатов кожи больных саркомой Капоши обнаруживают _____ клетки

- * атипичные
- * веретеновидные
- * церебриформные
- * акантолитические

Листок нетрудоспособности по уходу за больным взрослым членом семьи врачебная комиссия может продлить на срок до (в днях)

- * 30
- * 15
- * 7
- * 45

Дифференциальный диагноз «Трихофития волосистой части головы» следует проводить с

- * монилетриксом
- * трихотилломанией
- * болезнью Дарье
- * трихорексисом

После открытия листка нетрудоспособности длительно болеющие при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе направляются на медико-социальную экспертизу через (в месяцах)

- * шесть
- * три

- * четыре
- * два

Проведение любого химического пилинга приводит к

- * ожогу I степени
- * смягчению кожи
- * гиперпигментации
- * фотостарению

Если при гистологическом исследовании биоптата кожи, взятого из очага поражения, выявляют выраженный отек сосочкового слоя дермы, вакуольную дистрофию базальных кератиноцитов, периваскулярные инфильтраты с примесью эозинофилов и нейтрофилов, эпидермис без выраженных изменений, клиническая картина характерна для

- * обострения хронической экземы
- * многоформной экссудативной эритемы
- * экссудативного псориаза
- * красного плоского лишая

Врачебная комиссия в медицинской организации создается и работает на основании

- * распоряжения органа исполнительной власти субъекта Федерации
- * постановления органов местного самоуправления
- * приказа руководителя медицинской организации
- * наличия лицензии по экспертизе профессиональной пригодности

Медицинские работники имеют право на

- * стимулирование труда в соответствии со спецификой и сложностью работы
- * оплату отдыха, проезда к месту отдыха за счет организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов
- * предоставление пациенту образцов лекарственных препаратов, полученных бесплатно от фармацевтических компаний
- * выписку лекарственных препаратов на бланках, содержащих рекламную информацию

После обучения по программам профессиональной переподготовки медицинские работники должны пройти

- * аттестацию
- * первичную аккредитацию
- * первичную специализированную аккредитацию
- * периодическую аккредитацию

Вторичный период сифилиса характеризуется

- * полиморфизмом высыпаний
- * наличием субъективных ощущений

- * злокачественностью течения и деструкцией тканей
- * склонностью к слиянию высыпаний

При проведении ПУВА-терапии у больных гнездовой алопецией используют _____ и его производные

- * псориаден
- * пенициллин
- * миноксидил
- * преднизолон

Гиподерма отсутствует в области

- * подошв
- * ладоней
- * красной каймы губ
- * мошонки

Широкие кондиломы появляются

- * во время вторичного рецидивного сифилиса
- * при рецидиве сифилиса
- * в начале третичного периода
- * через 1 месяц после заражения

При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности может быть продлен до (в месяцах)

- * 4
- * 10
- * 12
- * 6

Первичным морфологическим элементом при вульгарном сикозе является

- * пустула
- * узел
- * пузырек
- * бугорок

В патогенезе саркомы Капоши участвует вирус герпеса _____ типа

- * 1
- * 6
- * 8
- * 3

Для регрессирующей стадии псориаза характерен

- * феномен Кебнера
- * псевдоатрофический воротник Воронова
- * феномен Бенъе-Мещерского

* симптом «облатки»

К условно-патогенным микроорганизмам, вызывающим воспалительные заболевания мочеполовой системы, относят *M. Hominis* и

* *M. Genitalium*

* *U. urealiticum*

* *C. Trachomatis*

* *C. Pecorum*

Для вторичного рецидивного сифилиса характерно наличие

* положительных нетрепонемных тестов

* остаточных явлений первичной сифиломы

* отрицательных нетрепонемных тестов

* субъективных ощущений на месте локализации сифилидов

Листок нетрудоспособности выдается при предъявлении

* медицинской книжки

* страхового свидетельства

* страхового медицинского полиса

* паспорта

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимается на (в годах)

* 4

* 2

* 3

* 1

Противопоказано применение стимуляторов роста волос с сосудорасширяющим эффектом в _____ стадию гнездовой алопеции

* любую

* прогрессирующую

* регрессирующую

* стационарную

Базальная мембрана при дискоидной красной волчанке

* нечеткая

* расщепленная

* утолщена

* разрушена

Работодатель отчисляет в Федеральный фонд ОМС Российской Федерации _____ по отношению к фонду оплаты труда

* 2,8%

- * 4,6%
- * 5,1%
- * 3,6%

Гистологически выявленный лобулярный панникулит, может наблюдаться при

- * красной волчанке
- * атопическом дерматите
- * контагиозном моллюске
- * бляшечном парапсориазе

Экскориации являются типичными морфологическими элементами

- * витилиго
- * патомимии
- * пузырьчатки
- * эритразмы

Коллаген I типа встречается в соединительной ткани

- * хрящевой ткани
- * дерме плода, крупных сосудах, ретикулярных волокнах
- * костей, стенок артерий
- * базальной мембране, капсуле хрусталика

Каждый гражданин имеет право выбора врача-терапевта, врача общей практики, врача-педиатра в выбранной медицинской организации _____ раз (а) в год

- * 1
- * 3
- * 4
- * 2

В Российской Федерации обязанность по хранению медицинской документации возложена на

- * пациента
- * территориальный фонд ОМС
- * страховую компанию
- * медицинскую организацию

Симптом сетка Уикхема образуется за счет

- * папилломатоза
- * ретенционного гиперкератоза
- * неравномерного гранулеза
- * вакуольной дистрофии

Меланоциты локализуются преимущественно в _____ слое эпидермиса

- * зернистом

- * базальном
- * роговом
- * блестящем

Женщина, получившая в прошлом лечение по поводу вторичного сифилиса и снятая с учета со стойкой негативацией серологических реакций во время беременности

- * подлежит клинико-серологическому контролю
- * нуждается в дополнительном лечении
- * в лечении не нуждается, серологическому контролю не подлежит
- * нуждается в профилактическом лечении

В качестве основного показателя, влияющего на снижение рейтинга медицинской организации, является рост

- * количества обоснованных жалоб
- * пролеченных больных
- * впервые выявленных заболеваний
- * заболеваемости с временной утратой трудоспособности

При раннем врожденном сифилисе чаще всего возникает поражение

- * легких
- * печени
- * почек
- * желудка

Медицинской организации присваивается статус клинической, если на базе организации

- * проводятся клинические испытания
- * осуществляется практическая подготовка медицинских работников
- * проводится подготовка информационно-аналитических материалов
- * ведется научно-исследовательская работа

Для наружной терапии больного эритразмой можно назначить

- * бензилбензоата эмульсию
- * мометазона мазь
- * эритромицина мазь
- * ивермектина крем

Кератиноциты состоят в основном из

- * каротина, эластина и гликопротеидов
- * филлагрина, инволюкрина и церамидов
- * митохондрий, меланина и холестерина
- * каротина, меланоцитов и фибрина

К особенностям бактериального вагиноза при отсутствии инфекции, передаваемой половым путем, относят

- * минимальные воспалительные явления при наличии повышенного количества лейкоцитов в мазках, окрашенных по Граму
- * острое местное воспаление, наличие лейкоцитов в пределах нормы в мазках, окрашенных по Граму
- * острую местную воспалительную реакцию, резко повышенное количество лейкоцитов в мазках, окрашенных по Граму
- * отсутствие воспалительной реакции в мазках, окрашенных по Граму, снижение колоний лактобактерий и преобладание анаэробных микроорганизмов

Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, является

- * реабилитационной
- * плановой
- * экстренной
- * неотложной

X-сцепленный ихтиоз характерен для

- * детей
- * женщин
- * подростков
- * мужчин

Наиболее длительно витамин Д депонируется в

- * жировой ткани
- * лимфе
- * крови
- * селезенке

Стандарт медицинской помощи включает

- * информацию об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике конкретного заболевания
- * план диспансерного наблюдения пациента с указанием кратности осмотра врачами-специалистами, выполнения лабораторных и инструментальных исследований
- * усредненные показатели частоты предоставления медицинских услуг и кратности применения лекарственных препаратов
- * рекомендуемое штатное расписание структурных подразделений медицинской организации

При наличии признаков поражения суставов рекомендуют консультацию

- * врача-хирурга

- * врача-ревматолога
- * врача-инфекциониста
- * врача-травматолога-ортопеда

К факультативным предраковым заболеваниям кожи относят

- * болезнь Боуэна
- * пигментную ксеродерму
- * актинический кератоз
- * синдром Горлина

У пациента, получающего лечение ацитретином, могут появиться жалобы на

- * повышенную температуру тела
- * сухость кожи и слизистых оболочек
- * повышенный аппетит
- * повышенную потливость

Гистологическую картину без специфических изменений («Хроническое воспаление») часто наблюдают при типичном течении

- * липоидного некробиоза
- * красного плоского лишая
- * мелкобляшечного парапсориаза
- * экссудативного псориаза

В тяжелых случаях холинергической крапивницы возможно развитие

- * острой задержки мочи
- * преходящей потери зрения
- * нарушений сердечного ритма
- * астматического приступа

Рентгенографию трубчатых костей с целью обследования на ранний врожденный сифилис (выявление остеохондрита) ребенка в возрасте 6 месяцев

- * делать целесообразно
- * проводят на усмотрение врача
- * делать не имеет смысла
- * проводят в зависимости от результатов серореакций

Препараты из группы тетрациклинового ряда используют в лечении

- * гонококковой инфекции
- * хламидийной инфекции
- * урогенитального трихомониаза
- * бактериального вагиноза

В соответствии с ФЗ № 323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» пациент имеет право на выбор

- * методик лабораторного исследования

- * врача и медицинской организации
- * лекарственных средств при лечении в стационаре
- * методик инструментального обследования

Грибовидный микоз является заболеванием

- * вызванным грибковой инфекцией
- * злокачественным
- * доброкачественным
- * паранеопластическим

При сифилисе материал для исследования на бледную трепонему берется из

- * эрозивных папул
- * бугорковых сифилидов
- * регионарных лимфатических узлов
- * розеолы

Фаза активного роста волоса длится

- * 2-3 недели
- * около 100 дней
- * 2-5 лет
- * 1 год

Коллаген по своей природе – это

- * липид
- * гликозамингликан
- * углевод
- * белок

К основной мере профилактики заболеваний органов дыхательной системы у взрослого населения относят

- * соблюдение принципов рационального питания
- * адекватную физическую нагрузку
- * борьбу с табакокурением
- * профилактику стрессовых ситуаций

Венерическую лимфогранулему также называют

- * уrogenитальный хламидиоз
- * тропический бубон
- * африканский трипаносомоз
- * геморрагическая лихорадка

Среди факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний ведущую роль играет

- * образ жизни
- * генетическая предрасположенность

- * недостатки работы системы здравоохранения
- * окружающая среда

Лица, бывшие в половом контакте с больным ранним скрытым сифилисом более 2 месяцев тому назад, подлежат

- * двухкратному клинико-серологическому обследованию
- * однократному клинико-серологическому обследованию
- * клиническому наблюдению
- * обязательному превентивному лечению

Сведения о диагнозе заболевания у работающего инвалида в листке нетрудоспособности

- * обязательно указываются
- * могут указываться только по письменному заявлению инвалида
- * указываются по решению врачебной комиссии
- * не указываются

Апремиласт рекомендован для терапии больных

- * крупнобляшечным парапсориазом
- * псориазом
- * многоформной эритемой
- * атопическим дерматитом

Доступ гражданина к услугам в сфере здравоохранения посредством единого портала государственных услуг обеспечивается с помощью

- * лабораторной информационной системы
- * регистра медицинских работников
- * подсистемы ведения специализированных регистров населения
- * федеральной электронной регистратуры

В реабилитационном процессе могут участвовать медицинские работники, психологи и

- * юристы
- * специалисты по социальной работе
- * социологи
- * работники пенсионного фонда